- முதல் ஊசி – கருவுற்றல் பதிவு செய்யப்பட்டவுடன் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
- இரண்டாவது ஊசி – முதல் ஊசி கொடுக்கப்பட்ட பின் அடுத்த நான்காவது வாரத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும். (இது ஒருவேளை குழந்தை பிறந்து விட்டாலும் கூட கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும்.)
- ஊசி கொடுத்த இடத்தில் சிறிதளவு வீக்கம் மற்றும் தசை கடினம் அல்லது வலி இருக்கக்கூடும் என்பதை தெரியப்படுத்தவும்.

❖ இரும்பு மற்றும் போலிக் அமில மருந்துகள் தருதல்.

- ஒரு IFA இரும்பு & போலிக் அமில மாத்திரையில் 100 கிராம் இரும்புத்தாது மற்றும் 0.5 மிகி போலிக் அமிலம் உள்ளது.
- காலத்திட்டம் – குறைந்தபட்சம் கர்ப்பகாலத்தில் 100 நாட்கள்
- பிரசவத்தின் பின்னர் குறைந்தபட்சம் 3-6 மாதங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டும்.
- 400mcg போலிக் அமில மாத்திரைகள் 12 வாரம் வரையிலான கர்ப்பகாலத்தில் கொடுக்கப்படுவதால், நரம்புக்குழாய் குறைகள் தவிர்க்கப்படுகின்றன.

❖ அயோடின் உப்புகளை உட்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

❖ சுண்ணாம்புத்தாது ஒரு நாளைக்கு 500மிகி – 1கிராம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

❖ இரும்புச்சத்து மாத்திரைகள் பொதுவாக அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் உட்கொள்ள வேண்டும்.

❖ ஒரு வேளை வாந்தியுணர்வு, வயிற்றுவலி இருப்பின் உணவுக்கு பின்னர் அல்லது இரவிலோ உட்கொள்ளலாம்.

❖ இம்மாத்திரைகளை உட்கொண்டால் மலம் அடர்நிறத்தில் வெளியேறும்.

❖ அதிக அளவு நீர்மங்கள் மற்றும் நார்ப் பொருட்களை உட்கொள்வதன் மூலம் மலச்சிக்கலை தவிர்க்கலாம்

கர்ப்பகாலத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

❖ கர்ப்பகால பிரச்சனைகள்/பாதிப்புகள் தாய் மற்றும் கருவிலிருக்கும் குழந்தையின் உடலை பாதிக்கும்.

❖ குழந்தையின் உடல் உறுப்பு குறைபாடுகளை இவை ஏற்படுத்துகிறது. வெளிப்புறக்காரணிகள், கிருமிகள், புகையிலை, மது, தாயின் உடல்நிலை, வேதிப்பொருட்கள் மற்றும் மருந்துகளாலும் ஏற்படலாம்.

கர்ப்பகால ஆபத்தான அறிகுறிகள்

❖ பெண்ணுறுப்பில் இரத்தக்கசிவு

❖ தொடர் வாந்தி

❖ குளிர் மற்றும் காய்ச்சல்

❖ பெண்ணுறுப்பிலிருந்து நீர் வடிதல்.

❖ வயிறு மற்றும் மார்பு வலி.

❖ சிசுவின் அசைவுகளில் குறைபாடு அல்லது அதிகரிப்பு

செவிலியர் கர்ப்பமுற்ற பெண்ணிடம் மேற்கண்ட அறிகுறிகள் இருப்பின் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு வரும்படி கூற வேண்டும்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 177 1/5/2020 10:40:54 AM