மாணவர் செயல்பாடு

முதல் கர்ப்பம் தரித்த தாய்க்கான சுகாதாரக்கல்வியை தயார் செய்க.

கர்ப்பகாலத்தில் உள்ள சிறு உடல் கோளாறுகள் (MINOR DISORDERS)

- அதிகாலை சுகவீனம்
- வயிற்றெரிச்சல்
- சிரைகளின் வலுவிழப்பு, வீக்கம்
- முதுகுவலி
- மூச்சடைப்பு
- அதீத இதயத்துடிப்பு
- பெண்ணுறுப்பில் நீர்வடிதல்
- மலச்சிக்கல்



குறைந்தது வருடத்திற்கு 4 மில்லியன் பிறந்து 28 நாட்களுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் இறக்கின்றன. (இது ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதத்தில் 40% ஆகும்.

- முதல் ஏழு நாட்களில் முக்கால் சதவீத குழந்தைகள் இறக்கின்றனர்.
- ஒவ்வொரு பிறந்த குழந்தையின் இறப்பிற்கு காரணம் என்னவென்றால்
- 20% குழந்தை பிறப்பின் போது ஏற்படும் காயங்களும், குறை பிரசவத்தால் ஏற்படும் சிக்கல்கள் மற்றும் பிற குறைபாடுகளே ஆகும்.
- வளர்ந்த நாடுகளை காட்டிலும், குறைந்து வளர்ந்த நாடுகளில் பிறந்த குழந்தைகளின் மரணம் 14 மடங்கு உயர்வாக உள்ளது. வதன் மூலம் மலச்சிக்கலை தவிர்க்கலாம்

இவையாவும் கர்ப்பகாலத்தில் இயல்பாக ஏற்படுபவையே. இதற்கென சிறப்பு சிகிச்சைகள் தேவையில்லையெனினும் அது இயல்பு வாழ்க்கையை பாதிக்கும் பட்சத்தில் மருத்துவரை அணுகுவதே சிறந்தது. மேற்குறிப்பிட்ட காரணிகளை அடுத்த வருகை வரை கண்காணிக்கவும்.

பிரசவத்திற்கு தயார் செய்தல்

கடைசி சில மாதங்களில் கருவுற்ற பெண்ணிற்கு கீழ்க்கண்ட அறிவுரைகள் வழங்கப்படும்.

- உண்மையான மற்றும் போலியான பிரசவ வலிகளை இனம் காணுதல்.
- மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டிய நேரம்.
- வலியை மேற்கொள்ளும் விதம்
- பிரசவத்தின்போதும் அதை தொடர்ந்தும் வைத்திருக்க வேண்டியவை
- குழந்தை வளர்ப்பு
- சிசுவை கையாளும் முறை

5.11 பிரசவத்துக்குபின் பராமரிப்பு

முன்னுரை

பிரசவத்திற்கு பின்னர் சுமார் 60% தாய் சிசு மரணங்கள் ஏற்படுகின்றன. பெரும்பான்மை தாய் சேய் நலக்குறைவுகள் பிரசவத்தை அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் நிகழ்பவை. (பிரசவத்திற்கு பின் உள்ள காலம்) ப்யூபேரியம் என்பது பிரசவத்தை தொடர்ந்து உள்ள காலம் முதல் கருவுறுதலுக்கு முந்தைய நிலையை பெண் அடைவதற்கு ஆகும் இடைப்பட்ட காலமாகும்.

- இது சுமார் 6 வார காலமாகும். பிரசவத்தையடுத் சிகிச்சைகள் சுமார் 6 வாரம் வரை தொடரும்.

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 178 1/5/2020 10:40:54 AM