பிரசவத்தையடுத்த சிகிச்சையின் இலக்குகள்

- தொப்புள் கொடி நஞ்சுப்பை சேருமிடத்தில் தொற்றை தவிர்த்தல்
- சிசுவிற்கான சிகிச்சை
- தாய்ப்பால் புகட்டத் தூண்டுதல்

செவிலியர் ஆய்வு

பிரசவத்தை தொடர்ந்து 1 மணி நேரத்தில் நஞ்சுப்பை வெளியேற்றம் (பிரசவத்தின் 4ம் நிலை) என்பது மிக முக்கியமானதாகும். அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கும் இந்நேரத்தில் ஏற்படுகிறது.

பிரசவத்தையடுத்த சிகிச்சை உள்ளீடுகள்

1. இந்த கண்காணிப்பு, நாடித்துடிப்பு, இரத்த அழுத்தம், மூச்சு வெப்பநிலை, தோல் நிறம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த முக்கிய காரணிகள் முதல்நாள் ஒவ்வொரு 4 மணிநேரத்திற்கு ஒரு முறையும், அதைத்தொடர்ந்து 8–12 மணிநேரத்திற்கு ஒரு முறையும், அளவிட வேண்டும்.

2. BUBBLE – HE என்ற ஆங்கிலப்பதம் பிரசவத்தையடுத்த சிகிச்சை படிநிலைகளை விளக்க உதவுகிறது.

- B – Breast – மார்பகம்
- U – Uterus – கருப்பை
- B – Bladder – சிறுநீர்ப்பை
- B – Bowels – குடல்
- L – Lochia – லோகியா (கருப்பை இரத்த ஒழுக்கு)
- E – Emotional Status – மனநிலை
- H – Homan's – (ஹோமன்'ஸ்)
- E – Episiotomy & perineum – எபிஸியோடமி மற்றும் பெண்ணுறுப்பு

B: மார்பகம் (BREAST)

பாலூட்டும் தாய்மார்கள் என்றால் அவர்களின் மார்பக வீக்கம் மற்றும் முலைக்காம்பின் நிலை அறிந்துக் கொள்தல்.

- அளவு, அமைப்பு, கடினத்தன்மை, சிவந்திருத்தல், சீரமைவு
- ஏதேனும் கட்டிகள் குமிழ்கள் இருக்கிறதா என ஆய்க.
- முலைக்காம்பின் உள்நோக்கு மடிப்பு, தட்டையாதல், பிளவு, இரத்தக்கசிவு, வலி மற்றும் கொப்புளங்கள்
- தனிப்பட்ட முறையில் பாலூட்டும் வழிமுறைகளை விளக்குக.
- மார்பக வீக்கங்களை கண்டறிதல் (வீக்கம், தடிப்பு, கடினத்தன்மை பளபளப்பான திசுக்கள்) ஒருவேளை பாலூட்டும் பெண் இத்தகைய அறிகுறிகளைப் பெற்றிருப்பின்
  - வெதுவெதுப்பான துணியை மார்பின் மீது போர்த்துதல் மற்றும் தசை இறுக்கத்தை தளர்த்துதல் மூலம் இயல்புநிலை அடையச் செய்தல்.
  - தாய்ப்பால் வெளியேற்றும் கருவிபோன்றவற்றை பயன்படுத்தி சிறிதளவு தாய்ப்பாலை வெளியேற்றுவதன் மூலம் குழந்தை பால் அருந்துவதற்கு ஏற்றவாறு செய்தல்.
  - குழந்தைக்கு பால் புகட்டுதல்.
  - சிறிதளவிலான வலி மருந்துகளைப் பயன்படுத்துதல்.

U: கருப்பை (UTREUS)

வயிற்றுப்பகுதி – கருப்பை மறுசீரமைவைக் கண்காணித்தல்.

- கருப்பை தலைப்பகுதியின் கடினத்தன்மையை தொடர்ந்து கண்காணித்தல்.
- கருப்பை தலைப்பகுதி தொட்டுணர்தல் சோதனையில் மிகக் கடினமாகவோ அல்லது சுருங்கும் தன்மையுடனோ – 10ம் நாளில் உணர இயலாததாகவே இருப்பதைக் கண்டறிதல்.
- பிரசவத்திற்கு பின் வரும் பிரசவ வலியை

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit 5.indd 179 1/5/2020 10:40:55 AM