
(எ.கா) வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் குறைவு குள்ளத்தன்மையையும் அதிக அளவு சுரப்பு அசுரத் தன்மையையும் உண்டாக்குகிறது.

6.2.2 வளர்ச்சி நிலைகள்

1. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை – பிறப்பிலிருந்து நான்கு வாரங்கள்
2. இளம் குழந்தை – ஒரு மாதத்திலிருந்து ஒரு வயது வரை
3. நடை பயிலும் பருவம் – ஒரு வயது முதல் 3 வயது வரை
4. பள்ளிக்கு முந்தையப்பருவம் – மூன்று வயதிலிருந்து ஆறு வயது வரை
5. பள்ளிப் பருவக் குழந்தை – ஆறு வயது முதல் பன்னிரெண்டு வயது வரை
6. வளரிளம் பருவம் – பன்னிரெண்டு வயது முதல் பத்தொன்பது வயது வரை

உடல் வளர்ச்சி



தூண்டல்

முழு உடலின் அசைவு எ.கா தேக்கரண்டியைக் கையாளுதல்.

துலக்கம்

சரியான அசைவிற்கு அதிகப் படியான கற்றல் எ.கா தலைக்கட்டுப்பாடு.

6.2.3 இளம் குழந்தை (1–12 மாதங்கள்)

இளம் குழந்தைப் பருவத்தில் தூண்டல், துலக்கம் மற்றும் சமூக நிலைகள் வேகமாக வளர்ச்சியடைகின்றன.

உடல் வளர்ச்சி

இளம் குழந்தையின் உடல் எடை 6 மாதத்தில் பிறப்பு எடையைப் போல் இருமடங்காகவும் 1 வயதில் மூன்று மடங்காகவும் அதிகரிக்கிறது.

உயரம் 50% ஒரு வருடத்தில் அதிகரிக்கிறது. தலைச் சுற்றளவும் மார்புச் சுற்றளவும் ஒரு வருடத்தில் சமமாகிறது.

நாடித்துடிப்பு 130 – 140 / நிமிடம்.

சுவாசம் 36 – 40 / நிமிடம்

இரத்த அழுத்தம் 64/41 – 95 /58 mmHg

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குறைமாதக் குழந்தையாகப் பிறந்து புகழ்பெற்றவர்கள் – ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், ஐசக் நியூட்டன், மார்க் த்வான், ஸ்டீவ் வொண்டர், ஜோகன்னஸ் கெப்ளர், மற்றும் திரு. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்பவர்களாவர்.

பல் முளைத்தல்

முன்வெட்டுப்பற்கள் 6 – 8 மாதங்களில்

பக்கவாட்டுப்பற்கள் 8 –11 மாதங்களில்

6.2.4 மைல் கற்கள்

1 மாதம் – தாயின் சத்தத்தை அறிந்து கொள்ளுதல்

2 மாதங்கள் – சமூகப் புன்னகை

3 மாதங்கள் – தலைக் கட்டுப்பாடு

4 மாதங்கள் – சத்தமாக சிரித்தல்

5 மாதங்கள் – வயிற்றுப் பக்கமாக புரளுதல்

6 மாதங்கள் – உதவியுடன் உட்காருதல்

7 மாதங்கள் – உதவியின்றி உட்காருதல்

8 மாதங்கள் – தவழுதல்

9 மாதங்கள் – துணையுடன் நிற்றல்

10 மாதங்கள் – துணையில்லாமல் நிற்றல்

11 மாதங்கள் – துணையுடன் நடத்தல்

12 மாதங்கள் – துணையில்லாமல் நடத்தல்

XII_Nursing_Vocational_TM_Unit 6.indd 197 1/5/2020 10:41:48 AM