பொதுவான பிரச்சனைகள்	மேலாண்மை
நீரற்ற நிலை (Dehydration) எடுத்துக்கொள்ளப்படும் திரவத்தை விட உடலில் இருந்து வெளியேறும் திரவம் அதிகரிக்கும் நிலையே நீரற்ற நிலை எனப்படும். கடுமையான பேதி மற்றும் வாந்தியின் போது இந்நிலை ஏற்படுகிறது. குழந்தைகளில் இது அபாயகரமானநிலை ஆகும். **நீரற்ற நிலையின் அறிகுறிகள்:** • குறைந்த அளவு சிறுநீர் அல்லது கழிக்காத நிலை சிறுநீர் • திடீரென்ற உடல் எடை குறைவு • உலர் வாய் • உள்வாங்கிய கண்கள், கண்ணீர் அற்ற கண்கள் • நெகிழ்ச்சித் தன்மையற்ற மற்றும் நீட்டலான தோல் • அபாயகரமான நீரற்ற நிலை வேகமான, வலுவிழந்த நாடித்துடிப்பு, ஆழ்ந்த மூச்சு, காய்ச்சல் அல்லது வலிப்பு ஆகியன ஏற்படலாம்.	**நீரற்ற நிலையை தடுக்கும் மற்றும் சிகிச்சையளிக்கும் முறைகள்:** • மிக அதிக அளவு தண்ணீர், திரவங்கள், தேநீர், சூப் போன்றவை அருந்த வேண்டும். • நீர் இழப்பை ஈடுசெய்யுமளவிற்கு அதிக அளவு திரவம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். • நீர் இழப்பு திரவத்தை தாய்மார்கள் தயார் செய்யலாம். • 4 விரல் அளவு சர்க்கரை அல்லது வெல்லம் மற்றும் 3 சிட்டிகை அளவு உப்பு ஆகியவற்றை ஒரு லிட்டர் கொதித்து ஆற வைத்த தண்ணீருடன் சேர்க்க வேண்டும். • சரியாக சிறுநீர் கழிக்கும் வரை இரவு,பகலாக 5 நிமிடத்திற்கு ஒரு முறை இக்கரைசலை ஒரு மடங்கு வழங்க வேண்டும். சிறு குழந்தையெனில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு 1 லிட்டராவது அளிக்க வேண்டும்.
நீர் இழப்பு திரவத்திலுள்ள பொருட்கள்: • இவை பல விதமான பெயர்களில் கடைகளில் கிடைக்கின்றன. குளுக்கோஸ் – 20 கி. • சோடியம் குளோரைடு – 3.5கி • சோடியம் பைகார்பனேட் – 2.5கி • பொட்டாசியம் குளோரைடு – 1.5கி 	**வாய்வழி நீர் ஏற்ற உப்புக் கரைசல் செய்ய:** • கைகளை கழுவ வேண்டும். • சுத்தமான பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும். • முத்திரையிடப்பட்ட பொட்டலத்தை திறந்து அதிலிருப்பதை பாத்திரத்தில் ஊற்றி நன்கு கலக்க வேண்டும். • ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கரைசல் தயாரிக்க வேண்டும். • பாத்திரத்தை எப்பொழுதும் மூடி வைக்க வேண்டும்.
சர்க்கரை உப்புக்கரைசலில் உள்ள பொருட்கள்: • சர்க்கரை – 40 கி (அ) தேன்/குளுக்கோஸ் – 20கி • சாதாரண உப்பு – 5கி (1சிட்டிகை) • 1லிட்டர் தண்ணீர் – இவற்றை குளிர்ந்த நீரில் கலந்தபின்பு அதன் சுவையானது கண்ணீர் சுவை போல் இருக்கும்.	• நபர் வாந்தி எடுத்தாலும், இந்த நீர் இழப்பை ஈடு செய்யும் திரவத்தை சிறிது சிறிதாக தர வேண்டும். • இக்கரைசலையும் நபர் வாந்தி எடுத்தால், அவரை மருத்துவமனையில் கொண்டு சென்று சிரையின் வழியாக திரவத்தை செலுத்த வேண்டும்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 1.indd 13 1/11/2020 4:59:34 PM