
பொதுவான பிரச்சனைகள்	மேலாண்மை
• உணவு நஞ்சாதல் • சில குறிப்பிட்ட உணவுகளால் ஏற்படும் அழற்சி • ஆம்பிசிலின் அல்லது டெட்ரானசக்கிளின் போன்ற சில மருந்துகளில் ஏற்படும் பக்க விளைவுகள் 	**நீரற்றநிலையை தடுத்தல் மற்றும் குறைத்தல்:** • நீர்மமாக பேதி இருப்பின் அந்நபர் அதிகஅளவு திரவத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். • நீர் இழப்பு ஈடுசெய்யும் நீர்மத்தை அதிக அளவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். **ஊட்டச்சத்து தேவையை பூர்த்தி செய்தல்:** • நீர் இழப்பு இருப்பவருக்கு அதிக அளவு உணவு தேவைப்படுகிறது. குழந்தைகள் மற்றும் மோசமான ஊட்டச்சத்து குறைபாடுயுடைய நபர்களுக்கு இது அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. • தாய்ப்பால் – குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் மிகச்சிறந்த உணவாகிறது. • குழந்தைக்கு பேதியிருப்பினும் தாய்ப் பாலைத் தொடர்ந்து தர வேண்டும். **பேதியின் மருந்துகள்:** கயோலின் மற்றும் பெக்டின் உள்ள பேதி மருந்துகள் மலத்தை சற்று திடமாக்கி மேலும் அடுத்தடுத்த நிகழ்வை குறைக்கவும் செய்கிறது. ஆனால், இவை நீர் இழப்பை சரிசெய்யவோ அல்லது தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்தவோ செய்யாது. சில பேதி தடுப்பு மருந்துகளான டைபைனோஆக்ஸலேட் போன்றவை தொற்று நோயை நீடிக்கின்றன.
இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை பாதிக்கும் பிரச்சனைகள்: உயர் இரத்த அழுத்தம், இரத்தக்கசிவு, அதிர்ச்சி, நெஞ்சு வலி, கால்களில் வீக்கம் மற்றும் இரத்தசோகை போன்ற பிரச்சனைகள் பொதுவாக சந்திப்பவையாகும். **உயர் இரத்த அழுத்தம் (*High blood pressure*):** அடிக்கடி தலைவலி, சிறிய வேளையின்போதும் மூச்சு திணறல் ஏற்படுதல், சோர்வு, மயக்க உணர்வு மற்றும் தூக்கத்தின் இடையில் ஏற்படும் இதயப் படபடப்பு போன்ற புகார்கள் உயர் இரத்த அழுத்த நபர்களிடம் காணப்படும். சிறுநீரக நோய்கள், உயர் இரத்த அழுத்த இருதய நோய்கள் அல்லது பேறுகால வலிப்பு நோய் அல்லது கர்ப்பகால வலிப்பு நோய் உள்ளவர்களிடம் உயர் இரத்த அழுத்தம் காணப்படும்	• உடலியக்கக்குறிகளை சரிபார்த்தல், இரத்த அழுத்தத்தை கணக்கிடல் மற்றும் பின்விளைவுகளை கவனித்தல். • முறையான சிகிச்சையில் நோயாளி உள்ளாரா என கவனித்தல் மேலும் நலக் கல்விகளை வழங்குதல். • உடற்பருமனை தவிர்த்தல் • குறைந்த அளவு உப்பை சமையலுக்கு பயன்படுத்துதல். • புகை பழக்கம் மற்றும் மது அருந்துதலை தவிர்த்தல்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 1.indd 15 1/11/2020 4:59:34 PM