அணுகவும்.

- அதிகப்படியான தாகம் நீரற்றநிலையின் முதல் அறிகுறி
- குறைந்த அளவு சிறுநீர் கழித்தல், அடர் மஞ்சள் நிற சிறுநீர்
- திடீரென உடல் எடைக் குறைவு
- உலர்ந்த வாய்
- குழிவிழுந்த கண்கள்
- மீள் தன்மை அற்ற தோல்

வீட்டில் சிகிச்சை முறை:

- குடிப்பதற்கு அதிகபடியான திரவமும் அரிசி கஞ்சியும்.
- உணவு உட்கொள்ளுதல் – நோய்ப்பட்ட குழந்தை மற்றும் பெரியவர்கள் உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பித்தவுடன் அடிக்கடி விருப்பமான உணவைக் கொடுக்க வேண்டும்.
- குழந்தையாக இருந்தால் தாய் பாலைத் தொடர்ந்து கொடுக்க வேண்டும்.
- குடிப்பதற்கு ORS திரவம் 5 நிமிடத்திற்க்கு ஒரு முறை கொடுக்க வேண்டும்.
- பெரியவர்களுக்கு 3 லிட்டர் தண்ணீர் அல்லது திரவம் ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கவும். குழந்தைகளுக்கு 1 லிட்டர் திரவம் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கக் கொடுக்கவும்.
- வேக வைத்து மசித்த உருளை கிழங்கு மற்றும் ஓட்ஸ் உணவு, அல்லது நன்கு சமைக்கப்பட்ட உணவு கொடுக்கப்படலாம்.

ORS தயாரிப்பு முறையை மேற்கொள்ளுதல்

3.பல்வலி:

- உணவு துகள்களை நீக்கி பற்களை சுத்தம் செய்யவும்.
- வெது வெதுப்பான உப்பு நீரால் வாயை கொப்பளிக்கச் செய்யவும்.
- பூண்டு, கிராம்பு எண்ணெய் அல்லது கொய்யா இலைகளை பயன்படுத்தலாம்.
- பல் தொற்று (வீக்கம், சீழ், நிணநீர் முடிச்சுகளை தொடுவதினால் வலி) அதிகமாக இருந்தால் மருத்துவரை அணுகவும்.

4.மலச்சிக்கல்:

மலச்சிக்கல் என்பது கடினமாகிவிட்ட மலம், மூன்று அல்லது அதற்கும் அதிகமான நாட்கள் மலம் கழிக்காமல் இருப்பதே ஆகும்.

காரணங்கள்:

- குறைவான திரவங்களை உட்கொள்ளுதல்
- நார்சத்து பொருள்களை குறைவாக உட்கொள்ளுதல்.
- பழங்கள், பச்சைக்காய்கறிகள், கீரைகள், குறைந்த அளவு உட்கொள்ளுதல்.
- குறைவான உடற்பயிற்சி

வீட்டில் சிகிச்சை முறை:

- ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
- தினமும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை சேர்க்கலாம். (முழுதானியங்கள், ரொட்டி, கேரட், உலர்ந்த திராட்சை, கொட்டைகள், பூசணி, கோதுமைத் தவிடு போன்றவை)
- சரியான உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளுதல்.
- மலங்கழிக்கும் நேரத்தை ஒழுங்குப்படுத்துதல்.

5.வலிப்பு நோய்

வலிப்பு என்பது திடீரென நினைவு இழப்பதும், கை கால்களின் தன்னிச்சையான அசைவுகளும் வலிப்பு எனப்படும்.

XII_Nursing_Practical.indd 349 1/4/2020 7:52:02 PM