- உலர்ந்த தோல்
- குழிவிழுந்த கண்கள்
- உடல் வறட்சி (Dehydration)

சிகிச்சை

- வயிற்றுபோக்கினால் உடல் இழந்த நீரின் அளவை மீண்டும் திரவங்களை கொடுத்து சரிநிலைபடுத்தல்.
- வாய்வழி நீர் ஏற்றம் (Oral Rehydration Solution)
- சிரைவழியாக திரவத்தை சரிநிலைபடுத்தல்.
- ஆண்டிபயாடிக்குகள் (டெட்டராசைக்லின் சிப்ரோஃபிலோக்ஸின்) மற்றும் துத்தநாக சேர்க்கை போன்றவை காலராவின் முக்கிய சிகிச்சையாகும்.

தடுப்பு முறைகள்

- சுத்தமான மற்றும் பாதுகாப்பான நீரை எப்பொழுதும் அருந்த வேண்டும்.
- சமைக்கும் முன் கைகளை கழுவ வேண்டும்.
- சோப்பு மற்றும் தண்ணீர் கொண்டு கைகளைக் கழுவ வேண்டும்.
- பச்சை மற்றும் முழுமையாக வேக வைக்கப்படாத உணவைத் தவிர்த்தல்.
- எப்பொழுதும் கொதிக்க வைத்து வடிகட்டிய நீரையே அருந்த வேண்டும்.

மாணவர் செயல்பாடு

கற்றல் உதவி அட்டைகளை செய்து, அதன் மூலம் சமுதாய மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சுகாதாரமற்ற நடவடிக்கைகளை தவிர்க்க அறிவு புகட்டவும்.



2.2.2 வயிற்றுப்போக்கு – பேதி (Diarrhoea)

வயிற்றுப்போக்கு என்பது எதிர் பார்க்காத அளவிற்கு மலம் தண்ணீர் போன்று கழிப்பதாகும். இதன் விளைவாக நீர் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் உறிஞ்சுதல் குறைவடைகிறது. இது பெரும்பாலும் மாசுப்பட்ட நீர் மற்றும் உணவு மூலம் ஏற்படுகிறது. 3-4 வாரத்திற்கு மேற்ப்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு நாட்ப்பட்ட வயிற்றுப் போக்காகும்.

நோய்க்காரணி

- ரோட்டா வைரஸ் (Rotavirus)
- நோரோ வைரஸ் (Norovirus)

நோய்முற்றும் காலம்

- சில மணி நேரம்

பொதுவான காரணி



வயிற்று போக்கின் காரணிகள்

அறிகுறிகள்



சிகிச்சை

1. தீவிர வயிற்றுப்போக்குக்கு இல்ல சிகிச்சை முறை போதுமானது.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 30 1/11/2020 5:08:12 PM