
2. பால் சார்ந்த உணவுப் பொருள்களை தவிர்த்தல்.

3. குழந்தைகள் வாய்வழி நீர் ஏற்றம் (ORS) முறை மூலம் திரவத்தன்மையை அதிகரிக்கலாம்.

4. நாட்ப்பட்ட வயிற்றுபோக்குக்கு ஆன்டிபயாடிக்குகள் (செஃபிக்ஸிம், செஃட்ராக்ஸின், மற்றும் செஃபாடாக்ஸிம்) வயிற்றுப்போக்கின் அறிகுறிகளை சரிசெய்யும்.

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்



2.2.3 டைபாய்டு (Typhoid)



இது ஒரு தொடர்ச்சியான அதிக காய்ச்சலுடன் கூடிய தீவிர நோய், சால்மோனெல்லா டைபி என்ற பாக்டீரியா இதன் காரணியாகும். இது நீர் மற்றும் உணவு மூலமும், பாதிக்கப்பட்ட நபரின் மலத்தின் மூலமும் பரவுகிறது. டைபாய்டு காய்ச்சலின் மற்றொரு பெயர் என்ட்ரிக் (entric) காய்ச்சல் எனப்படும்.

நோய்க்காரணி

- சால்மோனெல்லா டைபி (*Salmonella typhi*)

நோய் முற்றும் காலம்

- 8 முதல் 14 நாட்கள்

டைபாய்டு அறிகுறிகள்

- பசியின்மை
- சோர்வு/பலவீனம்
- வயிற்றுவலி
- வாந்தி
- வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல்
- உயர்காய்ச்சல்
- தலைவலி

சிகிச்சை

இந்த நோயின் சிகிச்சையில் பாக்டீரியா நோய்த் தொற்றை அழிப்பதற்கு ஆண்டிபயாடிக்குகள் அவசியம் (ட்ரிம்மத்ரோபிரிம் – சல்பமெத்தாக்ஸ் சோல் (Trimethoprim – Sulfamethoxazole), ஆம்பிசிலின் (Ampicillin) மற்றும் சிப்ரோஃபிலாக்ஸின் (Ciprofloxacin))

டைபாய்டு ஆபத்து அதிகமாக உள்ள இடங்களில் டைபாய்டு தடுப்பூசிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

- சுத்தமான மற்றும் பாதுகாப்பான நீர் அருந்துதல்.
- முழுமையாக சமைப்படாத காய்கறிகள் உண்பதை தவிர்த்தல்.
- தெருகடை உணவுகளை தவிர்த்தல்
- சாப்பிடுவதற்கு முன்னும், கழிவறைகளை பயன்படுத்திய பின்னும் கைகளை நன்றாக கழுவ வேண்டும்.

2.2.4 ஹெப்படைடிஸ் A



XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 31 1/11/2020 5:08:14 PM