அதிக அளவில் தொற்றக்கூடிய இந்த கல்லீரல் தொற்றின் காரணி ஹெப்படைடிஸ் A இந்த வைரஸ் கல்லீரலின் செயல்திறனை பாதித்து அழற்சிக்குள்ளாக்குகிறது.

நோய்க்காரணி


- ஹெப்படைடிஸ் A வைரஸ் (HAV)
- ஹெப்படோ வைரஸ்

நோய் முற்றும் காலம்

- 8 முதல் 14 நாட்கள்

ஹப்படைடிஸ் A வின் அறிகுறிகள்

- சோர்வு
- குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
- வயிற்றுவலி
- களிமண் நிற மலம் (Clay Stool)
- பசியின்மை
- மூட்டுவலி
- மஞ்சள் நிறத்தோல்
- அதிகமான அரிப்பு



சிகிச்சை

- ஊட்டச்சத்து மற்றும் நீரை ஈடுசெய்தல்
- வலிநீக்கி
- முழுமையான ஓய்வு
- மதுவை தவிர்த்தல்
- தொடர்ந்து 3 மாதங்கள் மருத்துவ கண்காணிப்பு அவசியம்

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

- ஹெப்படைடிஸ் A தடுப்பூசி கட்டாயமாக போட வேண்டும்.
- இரண்டு தவணையாக கொடுக்க வேண்டும்.
- வேலை செய்யும் இடம் மற்றும் பயணங்களில் உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

2.3 காற்றினால் பரவும் நோய்கள் (AIR BORNE DISEASES)

இருமல் மற்றும் தும்மலின் போது வெளிவரும் சளித்துகள்களின் நோய் கிருமிகள் காற்றில் கலந்து நோய்களை பரப்புகின்றன. பல மணி நேரம் இந்த கிருமிகள் காற்றிலேயே நிலைத்திருக்கும்.

காற்றினால் பரவும் நோய்களின் வகைகள்

வைரஸ் நோய்கள்	பாக்டீரியா நோய்கள்	பூஞ்சை நோய்கள்
சாதாரண சளி	காசநோய்	சிக் பில்டிங் சிண்ட்ரோம்
∴புளு	நிமோனியா	
தட்டம்மை	கக்குவான் இருமல்	
பொண்ணுக்கு வீங்கி	டிப்தீரியா	
ருபெல்லா	மெனின்ஜைட்டிஸ்	
சின்னம்மை	ஆன்தராக்ஸ்	

2.3.1 இன்புளுயன்சா

இது ஒரு பருவகால நோய், வைரஸ் இதன் காரணியாகும். இது சுவாச பாதையைத் தடை செய்யக்கூடிய தீவிர நோய்த் தொற்று. புளு அதிக தொற்றக்கூடிய மற்றும் பொதுவாக இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலமாக தொற்றுக்குள்ளான நபரிடமிருந்து பரவுக் கூடியது.



XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 32 1/11/2020 5:08:14 PM