நோய் காரணி உயிரினம்

❖ வெரிசில்லா சோஸ்டர்

நோய் முற்றும் காலம்

❖ 10 முதல் 21 நாட்கள்

அறிகுறிகள்

கொப்புளங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் தோன்றும்.

❖ தசை வலி

❖ பசியின்மை

❖ தடிப்பு – உடல் முழுவதும் தோன்றும்

❖ புள்ளிகளின் மேல் கொப்புளங்கள் காணப்படும்

❖ வாய்ப்புண்கள்

சிக்கல்கள்

❖ சின்னம்மை – நிமோனியாவிற்கு வழிவகுக்கும்

❖ மூளையழற்சி நோய்

❖ ரேஸ் சின்ட்ரோம் – கல்லீரல் மற்றும் மூளைவீக்கம்

சிகிச்சை

❖ வலி அல்லது காய்ச்சல் (அசிடாமினோபின்)

❖ அரிப்பு – கேலமைன் களிம்பு (calamine lotion)

❖ உடல் வறட்சி – சர்க்கரை நீக்கப்பட்ட போப்ரிக்கல்

❖ ஆண்டி வைரஸ்

❖ ஏசைக்ளோவிர்

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்


❖ இரண்டு தவணை வெரிசில்லா தடுப்பூசி

❖ ஒன்று 12 முதல் 15 மாதத்தில்

❖ மற்றொன்று 4 முதல் 6 வயதில்

2.3.3 நிமோனியா

நிமோனியா வீக்கத்துடன் கூடிய நுரையீரல் அழற்சி. இது பாக்டீரியல் தொற்றினால் உண்டாகிறது.



நோய்க்காரணி

❖ ஸ்ட்ரேப்டோகாகஸ் நிமோனியே (*Streptococus Pneumoniae*)

❖ ஹீமோஃபில்லஸ் இன்புளுயன்சா (*Hemophilus influenzae*)

❖ ஸ்ட்ரேப்டோகாக்ஸ் ஆரியஸ் (*Staphylococus aureus*)

நோய் முற்றும் காலம்

❖ 1 நாள் முதல் 1 வாரம் வரை

நிமோனியா வகைகள்

❖ இவ்வகை காரணி, இருப்பிடம், பெறப்பட்ட தன்மை கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

காரணி வகை	இருப்பிடம் வகை	பெறப்பட்ட வகை
பாக்டீரியல் நிமோனியா (ஸ்ட்ரேப்டோ காகஸ் நிமோனியா)	மருத்துவமனை யிலிருந்து பெறப்பட்ட நிமோனியா (HAP)	புரையேறுவதால் ஏற்படும் நிமோனியா
வைரஸ் நிமோனியா	சமூதாயத்தி லிருந்து பெறப்பட்ட நிமோனியா (AD)	வென்டிலேட்டர் (செயற்கை சுவாச கருவி) மூலம் ஏற்படும் நிமோனியா
மைக்கோ பிளாஸ்மா நிமோனியா		
பூஞ்சை நிமோனியா		

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 34 1/11/2020 5:08:15 PM