2.3.4 காசநோய் (Tuberculosis)

காசநோய்ஒருஅபாயகரமானநிலைக்குரிய தொற்றுநோயாகும். இது உடலின் அனைத்து பகுதிகளையும் பாதிக்கக்கூடியது. முக்கியமாக நுரையீரலைத் தொற்றுக்குள்ளாக்கும்.

நோய்காரணி

- மைக்கோ பாக்டீரியப் டியூபர்கிள் (*Mycobacterium tuberculi*)

நோய் முற்றும் காலம்

- 2 முதல் 12 வாரங்கள்


காசநோயின் வகைகள்

நுரையீரல் காசநோய்

- முதல்நிலை நோய்கள்
- இரண்டாம் நிலை நோய்கள்

நுரையீரல் அல்லா காசநோய்

- நிணநாள காசநோய்
- நுரையீரல் உறை காசநோய்
- மேற்சுவாச வழி காசநோய்
- எலும்பு காசநோய்
- சிறுநீரக காசநோய்
- நுண் காசநோய்
- இதய சவ்வு காசநோய்
- இரைப்பை காசநோய்
- மெனிஞ்சஸ் காசநோய்
- சில காசநோய்கள் குறைந்த அளவில்



காசநோய் பரவும் விதம்

- இருமல் – சளிதுகள்கள்
- கூட்டம் நிறைந்த காற்றோற்றமற்ற பகுதி
- எச்சில் துப்புதல்

அறிகுறிகள்

- நெஞ்சு வலி
- இரத்தத்துடன் கூடிய இருமல் சளி
- மூச்சு திணறல்
- சிறுநீர் நிறத்தில்மாற்றம்(சிவப்பு,கலங்கலான)
- மாலை நேர காய்ச்சல்
- சோர்வு

நோய்க்கண்டறிதல்

- பாக்டீரியல் பரிசோதனை (சிகில் நெல்சன் ஸ்டென்)
- சளி ஊடகவாளர் பரிசோதனை
- மார்பக எக்ஸ்ரே
- நியூக்லிக் ஆசிட் அம்பிலிஃபிகேசன்
- மாண்டொக்ஸ் பரிசோதனை (PPD)

சிகிச்சை

- **முதல்நிலை மருந்துகள்:** எ.கா ஐசோனியாசைடு (Isoniazid), ரிஃபாம்பின்(Rifampin), எதம்பூயூட்டால் (Ethambutal)
- **இரண்டாம் நிலை மருந்துகள்:** எ.கா. சைக்லோசிரின்(Cycloserine),எத்தினோமைடு (Ethionamide), லிவோஃலாக்சின் (Levofloxacin)

திட்ட அளவை (Dosage Regimen)

- தீவிர நிலை + தொடர்ச்சி நிலை
- HREZ (2மாதம்) + HRE (4 மாதம்)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

DOTS (DOTS – Direct Observe & Treatment) நேரடி பார்வையின் கீழ் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை, இது உலகளவில் காச நோய்க்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 36 1/11/2020 5:08:16 PM