தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

- முகமூடி அணிதல்
- பிசிஜி தடுப்பூசி
- தொடர் மருத்துவ பரிசோதனை
- நோயாளியைத் தனிமைப்படுத்துதல்
- காற்றோட்டம்
- சூரிய ஒளி
- புற ஊதா கிருமி நீக்கி கதிரியக்கம்

2.4 ஒட்டுண்ணிகள் மூலம் பரவும் நோய்

ஒட்டுண்ணிகள் பிற உயிரினங்களில் வாழ்ந்து, அந்த உயிரினத்தை தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கும், இனப்பெருக்கத்திற்கும், பரவுவதற்கும் பயன்படுத்தி அவ்வுயிரினத்தை தொற்றுக்குள்ளாக்குகின்றன.

நோய்க்காரணி (Causative organism)

ஒட்டுண்ணி தொற்று மூன்று விதமான நுண்ணுயிரிகளால் ஏற்படுகின்றனர்.

புற ஒட்டுண்ணிகள் (Ectoparasites)	புழுவகை ஒட்டுண்ணிகள் (Helminthes)	புரோட்டோசோவா (Protozoan)
மெல்லுடலி (Molasses)	குடற்புழு நோய் (Ascariasis)	மலேரியா
பேன் தொற்று (Pediculosis)	யானைக்கால் நோய் (Filariasis)	அமீபா அழற்சி
சிரங்கு (Scabies)	கொக்கி புழு நோய் (Hook worm disease)	இரத்தக் கழிச்சல் நோய் (Coccidiosis)

2.4.1 புரோட்டோசோவா தொற்று (Protozoa infection)

மலேரியா

மலேரியா என்பது ஒரு உயிர் அச்சுறுத்தும் நோய், இது ஒரு தொற்றுக்குட்பட்ட பெண் அனாபிலஸ் (Anopheles) கொசு கடிப்பதின் மூலம் பரவுகிறது. இந்த கொசுக்கள் பிளாஸ்மோடியம் ஒட்டுண்ணிகளை எடுத்துச் சென்று இரத்த ஓட்டத்தில் சேர்க்கின்றன.



மலேரியா நோய்க்காரணி

- பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் (*Plasmodium vivax*)
- பிளாஸ்மோடியம் ஓவல் (*plasmodium ovali*)
- பிளாஸ்மோடியம் மலேரியா (*plasmodium Malaria*)
- பிளாஸ்மோடியம் பால்சிபாரம் (*Plasmodium Falciparium*)

நோய்முற்றும் காலம்

9 முதல் *14* நாட்கள்

பரவும் முறை

- உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை
- இரத்தம் மாற்றுதல் (*Blood Transfusion*)

அறிகுறிகள்

- நடுக்கத்துடன் கூடிய குளிர்க்காய்ச்சல்
- தலைவலி
- வாந்தி
- சோர்வு
- வியர்வை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கொசுக்களுக்கு கார்பன்-பன்-டை ஆக்ஸைடின் மணம் பிடிக்கும். அவைகள் maxillary உணர் கொம்பின் மூலம் நம்முடைய சுவாசத்திலிருந்து வெளிவரக்கூடிய Co2 எளிதில் உணர்ந்து கொள்ளும்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 37 1/11/2020 5:08:17 PM