டெங்கு, சிக்கன்குனியா, சிகா, மஞ்சள் காய்ச்சலை பரப்பும் ஏடிஸ் பெண் கொசுக்கள் இருக்கும் இடங்கள்



கொசுவின் மூலம் பரவுகிறது. இவை இரண்டு வழிகளில் நிகழ்கிறது.

- டெங்கு காய்ச்சல்
- டெங்கு – இரத்தப்போக்கு சம்மந்தப்பட்ட காய்ச்சல்

நோய்க்காரணி

- ஏடிஸ் அஜிப்டி (*Ades Aegypti*) கொசுக்கள்

நோய் முற்றும் காலம்

- 2 முதல் 7 நாட்கள்

நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அடையாளங்கள்

- திடீரென அதிகரிக்கும் காய்ச்சல்
- கடுமையான முன்பக்க தலைவலி
- கண்ணின் அசைவு குறையும் பொழுது கண்பின்புறத்தில் வலி ஏற்படுதல்
- தசை மற்றும் மூட்டு வலிகள்
- சுவை உணர்வின்மை மற்றும் பசியின்மை
- மார்பு மற்றும் மேல் கை கால்களில் தடிப்பு போன்ற தட்டம்மை
- குமட்டல் மற்றும் வாந்தி

நோய் கண்டறிதல்

- ஹீமோகுலுட்டினேஷன்ஸ் தடுப்பான் (H1) சோதனை (*Haemagglutination inhibition (HI) test*
- காம்பிலிமெண்ட் நிர்ணயிக்கும் சோதனை (*CFT*) (*Compliment Fixation Test (CFT)*)
- நடுநிலைப்படுத்தல் சோதனை (*NT*) (*Neutralization test(NT)*)
- *IGM – நொதி பிடிப்பு (IGM – capture Exzyme)*
- மதிப்பீட்டு சோதனை (*MAC – ELISA* எலிசா)
- விரைவான கண்டறிதல் சோதனைகள் (*NS1*) (*Rapid Diagnostic tests (NS 1)*

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 40 1/11/2020 5:08:22 PM