- படர் தாமரை
- வெறிநாய்க்கடி (ரேபிஸ்)
- டெட்டனஸ்

பூனையின் குரல் ஒலியான 'மியாவ்' மற்ற பூனைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளுவதற்கு அல்ல. மனிதர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகவே பயன்படுத்தும் முறையாகும்.

2.6.1 ஆந்த்ராக்ஸ் (Anthrax)

ஆந்த்ராக்ஸ் என்பது தீவிர தொற்று நோய் கருமூலங்களை உருவாக்கும் பேசிலஸ் ஆந்த்ராசிஸ் என்ற பாக்டீரியா இதற்கு காரணியாகும். முதன்மையாக இந்த நோய் தாவரங்களை உண்டு வாழ்கிற விலங்குகளின் மூலம் பரவுகிறது, மற்றும் இவை பாலூட்டிகள் மற்றும் மனிதன் உட்பட அனைத்திற்கும் தொற்றை உண்டாக்கும். ஆந்த்ராக்சிஸ் முட்டைகள் (வித்துக்கள்) விலங்குகளின் உற்பத்தி கம்பளி, முடி, பதனிட்ட தோல், தோலுரித்தல், எலும்புகள், உணவு மற்றும் கார்காஸஸ் மூலம் காணப்படுகிறது. கருமூலங்கள் (Spores) பல வருடங்கள் உயிர்வாழ முடியும்.

நோய்க்காரணி

- பேசிலஸ் ஆந்த்ராக்சிஸ் (Bacillus anthracis)

நோய் முற்றும் காலம்

- 1 முதல் 7 நாட்கள்
- 60 நாட்கள் வரை நோய் வெளிப்படுதல்

நோய் பரவும் முறைகள்

இவற்றில் மூன்று முக்கிய பரவும் முறைகள் உள்ளன.

- நேரடித்தொடர்பு மூலம் பரவுதல்
- காற்று மூலம் பரவுதல்
- இரைப்பை நோய்த்தொற்று மூலம் பரவுதல்

நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அடையாளங்கள்

- தோல் சார் (சரும) நோய்த்தொற்று
- சோர்வு
- காய்ச்சல்
- தலைவலி
- சுவாச நோய்த்தொற்று
- நீலம் பரித்தல் (ஆக்ஸிஜன் குறைபாடு)
- அதிர்ச்சி
- மரணம்
- குமட்டல்
- பசியின்மை
- வாந்தி
- வயிற்று வலி
- இரத்தத்தில் நச்சுப் பொருட்கள் காணப்படுதல்

ஆபத்தான காரணிகள்

- விலங்குகள் மற்றும் விலங்குகளின் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களான தோல் மற்றும் அவற்றை பிரித்தெடுக்கும் தொழிலாளர்களுக்கு பரவுதல்.
- இறந்த விலங்குகளை கையாளும் பணியில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்களுக்கு பரவுதல்.

(Diagnosis) நோய் கண்டறிதல்

- பேசில்லஸ் ஆந்த்ராசிஸ் தோல் புண்களிடமிருந்து கண்டறியப்படும் நுண்ணுயிராகும்.
- சுவாச கசிவு.

சிகிச்சை

- நோய்க்கான சிகிச்சையை விரைவாக தொடங்க வேண்டும்.
- தோல்சார் நோய் தொற்றுக்கு வாய்வழியாக பென்சிலின் அல்லது டெட்ராசிலின் மருந்து மூலம் சிறப்பான சிகிச்சை அளித்தல் வேண்டும்.
- மூச்சு இழுத்தல் அல்லது இரைப்பை ஆந்த்ராஸ் – க்கு அதிகமான அளவில் சிரை வழியாக பென்சிலின் அளித்தல் வேண்டும்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 44 1/11/2020 5:08:29 PM