நோய் தடுப்பு முறைகள்

- கால்நடை பராமரிப்பவர்களுக்கிடையே ஆந்த்ராக்ஸை கட்டுப்படுத்துதல்.
- நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் இறைச்சி(அ)இறந்தவிலங்குகளின்இறைச்சி விற்பனை செய்வதை தடைப்படுத்துவதன் மூலம் இரைப்பை ஆந்த்ராசிஸ் தடுக்கலாம்.
- பணியிடத்தை வழக்கமாக சுத்தம் செய்தல் மற்றும்கிருமிநாசினியை உபயோகித்தலின் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- விலங்கின் மூலம் கிடைக்கும் உற்பத்திப் பொருட்களை கிருமி நீக்கம் செய்தல் வேண்டும்.
- பதனிடுதல், சாயம், தோலுறித்தல், கம்பளி மற்றும் எலும்பு ஆகியவற்றை அமில சிகிச்சையை பயன்படுத்தி பதப்படுத்துதல்

தடுப்பூசிகள் அளித்தல்

நல்ல சுகாதார பயிற்சி (கை கழுவுதல், கைகளை கண் மற்றும் வாய் பகுதியிடமிருந்து தவிர்த்தல்) மற்றும் வெட்டு, தேய்மானம், சிராய்ப்பு போன்ற காயங்களை மூடி வைக்க வேண்டும்.

2.6.2 டெட்டனஸ் (Tetanus)

டெட்டனஸ் என்பது பாக்டீரியா கிளாஸ்டிரிடியம் டெட்டனி காயங்கள் மூலம் தொற்றை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் இவை நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தசைகளுக்கு நச்சுத் தன்மையை உருவாக்குகிறது.



நோய்காரணி

- பாக்டீரியம் – க்ளோஸ்டிரிடியம் டெட்டனி

நோய் பரவும் காலம்

- 3–21 நாட்கள்

நோயின் அறிகுறிகள் மற்றும் அடையாளங்கள்


- தசை இறுக்கம்
- தாடைப் பூட்டு(Lock jaw)
- வலிமையான வயிற்று தசைகள்
- வலிநிறைந்த தசைப்பிடிப்பு
- சீரற்ற இருதய துடிப்பு
- உயர் இரத்த அழுத்தம்

நோய் கண்டறிதல்

- Clinical முறையில் மட்டுமே நோயை அறிதல்.
- காயமடைந்தவர்களில் 30% மட்டுமே இந்நோய் ஏற்படும்.

சிகிச்சை

- கவனமாக காயத்தை சுத்தம் செய்தல் சிறப்பான காய சிகிச்சைக்கு உதவும்.
- தடுப்பூசி டெட்டனஸ்னிடமிருந்து பாதுகாக்கும்.
- வலியைத் தடுக்க வலி நிவாரணி அளிக்க வேண்டும்.
- ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்சை (மெட்ரோனிடசோல் அல்லது பெனிசிலின்)
- லேசானதசைபிடிப்புள்ளநோயாளிகளுக்கு டையசிபாம் (Diazepam) மருந்தை சிரை வழியாக செலுத்துதல்.



XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 45 1/11/2020 5:08:30 PM