எச்.ஐ.வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள காரணிகளால் வரும் நோய் அல்ல..



பூச்சிக் கடிகள் | கழிப்பறை இடங்கள் | முத்தம் | பகிர்ந்துண்ணுதல்

எச்.ஐ.வி பரவும் முறை

- உடல் திரவங்கள்
- இரத்தம்
- தாய்ப்பால்
- விந்து
- பெண்ணுறுப்பு மற்றும் மலக்குடல் திரவங்கள்
- ஊசிகள் பகிர்தல்
- பச்சைக் குத்தும் சாதனங்களைப் பகிர்தல்
- கர்ப்ப காலத்தில் தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு பரவுதல்
- குழந்தைக்கு உணவூட்டும் முன் வாயில் மென்று தருதல் மூலம் (முன் அரைத்தல்)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- சிவப்பு ரிப்பன் என்பது (Red Ribbon) எச்.ஐ.வி யால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் HIV நோயாளிகளின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது.
- உலக எய்ட்ஸ் தினம் டிசம்பர் 1.

அடையாளங்கள்

- உலர்ந்த, வறண்ட தோல் (xeroderma)
- நாள்பட்ட சோர்வு
- காய்ச்சல் வந்து, வந்து போகும் (pyrexia)
- இரவில் அதிக வியர்வை
- அதிகமான உடல் எடை குறைவு
- வீங்கிய நிணநீர்முனைகள்
- நாக்கு, வாய் மற்றும் தொண்டையில் புள்ளிகள்
- மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய (அ) நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு
- கவலை மற்றும் மன அழுத்தம்

நோய் கண்டறிதல்

- ஆண்டிபாடி/ஆன்டிஜன் சோதனை (18 – 45 நாட்களுக்கு பிறகு)
- ஆண்டிபாடி சோதனை (23 மற்றும் 30 நாட்கள் கழித்து)
- நியூக்ளிக் அமில பரிசோதனை

எச்.ஐ.வி (HIV) பரிசோதனை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எச்.ஐ.வி சாளர காலம் (Window period)

எச்.ஐ.வி கிருமிக்கு தாக்கப்பட்ட காலத்திற்கும், இரத்தத்தில் அவை காணப்படும் காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம் HIV சாளர காலம். இந்த சாளர காலத்தில் HIV பரிசோதனையின் முடிவு எச்.ஐ.வி – யால் தாக்கப்படவில்லை (Negative) எனலாம்.

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 47 1/11/2020 5:08:33 PM