சிகிச்சை


- ஆன்டிரிட்ரோ வைரஸ் சிகிச்சை, இவை ஆறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
- NRTIs (நியூக்ளியோசைட் தலைகீழ் ட்ரான்ஸ் கிரிப்டஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ்)
- NNRTIs, (நியூக்ளியோசைட் தலைகீழ் ட்ரான்ஸ் கிரிப்டஸ் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அற்ற)
- ப்ரோடேஸ் தடைகள்
- இணைவு தடைகள்
- CCR5 எதிரான தடைகள்
- இடமாற்ற தடைகள்

எச்.ஐ.வி (HIV) தடுப்பு முறை

- எச்.ஐ.வி சோதனை பெறுதல்
- பாலியல் பங்குதாரர்கள் வரம்பு
- ஊசிகள் பகிர்வதைத் தவிர்த்தல்
- மருந்துகளில் இருந்து விலகி இருத்தல்
- இரத்த தொடர்பை தவிர்த்தல்
- பாதுகாப்பான உடலுறவு பற்றிய பயிற்சி
- எச்.ஐ.வி இருப்பதை அறிந்தால் உடனே அதற்குரிய நடவடிக்கை அல்லது சிகிச்சை எடுத்தல்.

HIV தோல் முதல் தோல் தொடர்பு, கட்டி அணைத்தல், கை கொடுத்தல், முத்தம், உணவு பகிர்தல், சானம், கழிப்பறை பகிர்தல், ஆடைகளை பகிர்தல் மற்றும் பூச்சிகளால் பரவும் நோய் கிடையாது.

2.7.2 கொனோரியா (Gonorrhoea)



கொனோரியா என்பது பாலுறவு மூலம் பரவும் நோய். நைசிரியா கொனோரியா என்றும் பாக்டீரியாவின் மூலம் உண்டாகிறது. இவை வெதுவெதுப்பான, ஈரமான உடலின் பாகங்களில் நோய் தொற்றை ஏற்படுத்துகிறது.

நோய்க்காரணி

நைசிரியா கொனோரியா (Nesseria Gonorrhoea)

நோய் முற்றும் காலம்

2–5 நாட்கள் கழித்து

அறிகுறிகள்

ஆண்களுக்கு,

- வெள்ளை, மஞ்சள், (அ) பச்சை நிற கழிவு சிறுநீரக வடிகுழாயின் மூலம் வெளியேறுதல் (சீழ் போன்று)
- விதைப்பையில் வலி
- வலி நிறைந்த (அ) அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
- குடலில் இருந்து கழிவு வெளியேறுதல், அரிப்புடன் கூடிய வலி, இரத்தக்கசிவு.
- அரிப்பு, கழுத்தில் நிணநீர் முடிச்சுகள் வீங்கி விழுங்குவதில் கடினம் ஏற்படுதல்
- கண் வலி, ஒளி உணர்திறன்
- கண்ணில் சீழ் வெளியேறுதல்
- சிவப்பு, வீங்கிய வெதுவெதுப்பான வலி மூட்டுகள்

பெண்களுக்கு,

- வலி நிறைந்த உடலுறவு
- காய்ச்சல்
- மஞ்சள் அல்லது பச்சை நிற பெண்ணுறுப்பு கழிவு வெளியேறுதல்
- பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு வீக்கம்
- மாதவிடாய் காலத்தில் இரத்தக்கசிவு

XII_Nursing_Vocational_Unit 2.indd 48 1/11/2020 5:08:34 PM