சிகிச்சை

மருத்துவசிகிச்சை

- வலி நீக்கும் மற்றும் தசைவலி குறைப்பு மருந்துகளை அளித்தல்.
- உடலின் நீரேற்றத்தை வாய்வழி மற்றும் சிரைவழி திரவத்தின் மூலம் ஈடு செய்தல்.
- உணவு முறையில் மாற்றம் – கால்சியம் குறைந்த உணவுகள்

அறுவைச் சிகிச்சை (Surgical management)

- சிறுநீரகப்பாதை கல் நொறுக்குதல் (அ) உடைத்தல்.
- (URSL – Ureteroscopic Lithotripsy)
- Intracorporeal Lithotripsy (கற்களை நொறுக்குதல்)
- லேசர் முறையில் கற்களை உடைத்தல்
- ESWL (Extra corporeal Shock wave lithotripsy)
- PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy)
- சிறுநீர்ப் பாதை கல் அகற்றுதல் (uretero lithotomy)
- சிறுநீர்பை கல் அகற்றுதல் (Cysto lithotomy)
- சிறுநீரகக் கல் அகற்றுதல் (Nephrolithotomy)
- சிறுநீரகத்தை அகற்றுதல்(Nephrectomy)



செவிலிய சிகிச்சை (NURSING MANAGEMENT)

- வலி நீக்கிகளின் மூலம் வலியைக் கட்டுப்படுத்துதல்
- வாந்தி நீக்கிகள் மூலம் வாந்தியைக் குறைத்தல்
- திரவ உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்ளுதல் மற்றும் ஓய்வெடுத்தல்
- நோயாளியை வசதியான நிலையில் வைத்தல்.
- நோயாளி உட்கொள்ளும் மற்றும் வெளியேற்றும் திரவ அட்டவணையை கணக்கிடுதல் (I/o chart)
- உணவுகளின் மாற்றங்கள் பற்றி அறிவுறுத்துதல்.

3.5.2 தீவிர சிறுநீரக செயலிழப்பு (ACUTE RENAL FAILURE)



பல்வேறு காரணங்களால் சிறுநீரகத்தின் செயல் திடீரென்று குறைந்து விடுதல்.

முதுகின் கீழ்பகுதியில் ஒரு ஜோடி சிறுநீரகங்கள் முதுகு தண்டில் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக அமைந்துள்ளன. இவை இரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் உடலிலுள்ள கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்றன. சிறுநீரகங்கள் நச்சுப்பொருட்களை சிறுநீர்ப்பைக்கு அனுப்புகின்றன. பின்னர் நச்சுப் பொருள்கள் சிறுநீர்க்கழிக்கும் போது வெளியேற்றப்படுகின்றன. இரத்தத்திலிருந்து கழிவு பொருட்களை வடிகட்டும் செயல்திறன் குறையும்போதுசிறுநீரகங்கள்பழுதடைகின்றன.

காரணங்கள்

- சிறுநீரகத்திற்கு முந்தைய காரணங்கள்: சிறுநீரகத்திற்கு குறைவான இரத்த ஓட்டம் ஏற்படுவதால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. (எ.கா) இரத்த இழப்பு, தீக்காயம், சிறுநீர்ப் பெருக்கி மருந்துகள் உபயோகித்தல்.
- சிறுநீரகத்திற்குப் பிந்திய காரணங்கள்:

XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_3.indd 76 1/4/2020 7:58:27 PM