அட்டவணை 1: சமீபத்தில் ICMR (2011) அடிப்படை நான்கு உணவுத் தொகுதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது

உணவுத் தொகுதிகள்	ஊட்டச்சத்துக்கள்
1. **தானியங்கள், தினை வகைகள் மற்றும் பயறுகள்** • தானியங்கள் மற்றும் தினைவகைகள்: அரிசி, கோதுமை,கேழ்வரகு, மக்காசோளம், பார்லி கம்பு, அவல் பொரி, கோதுமை மாவு, தானிய வகைகள் • பருப்பு மற்றும் பயிறுகள்: கொண்டைக் கடலை, உளுத்தம் பருப்பு, பாசிப்பயிறு, துவரை, காராமணி, உலர்ந்த பட்டாணி, ராஜ்மா, சோயா மற்றும் மொச்சை.	சக்தி, புரதம், கண்ணுக்கு புலப்படாத கொழுப்பு, வைட்டமின் 'B$_1$' வைட்டமின் B$_2$ ஃபாலிக் அமிலம், உயிர்சத்துக்கள், போலிக் அமிலம் இரும்புச்சத்து, நார்ச்சத்து. சக்தி, புரதம், கண்ணுக்கு புலப்படாத கொழுப்பு, B$_1$, B$_2$ உயிர்சத்து ஃபோலிக் அமிலம், கால்சியம், இரும்பு மற்றும் நார்ச்சத்து.
2. பால் மற்றும் மாமிச உணவுகள் • பால் மற்றும் ஆடை நீக்கப்பட்ட பால், பாலாடைக்கட்டி, தயிர். கோழி, இறைச்சி, ஈரல், மீன் முட்டை மற்றும் ஆட்டிறைச்சி.	புரதம், கொழுப்பு, B$_1$, B$_2$ உயிர்சத்து கால்சியம் மற்றும் இரும்புச்சத்து.
3. காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் • பழங்கள்: மாம்பழம், கொய்யா, தக்காளி, பப்பாளி, ஆரஞ்சு, சாத்துக்குடி, தர்பூசணி. • கீரை வகைகள்: தண்டுக்கீரை, பசலை, புளிச்சக்கீரை, முருங்கைக்கீரை, கொத்துமல்லி, வெந்தயக்கீரை. • காற்கறிகள்: காரட், வெங்காயம், கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், பீன்ஸ், குடைமிளகாய், காலிப்பிளவர், முருங்கைக்காய்.	கரோட்டினாய்டுகள், வைட்டமின் 'சி', நார்ச்சத்து கண்ணுக்கு புலப்படாத கொழுப்பு, வைட்டமின் 'சி$_2$', ஃபோலிக் அமிலம், நார்சத்து, இரும்புச்சத்து. கரோட்டினாய்டுகள்.வைட்டமின் 'பி$_2$', ஃபோலிக் அமிலம், கால்சியம், நார்ச்சத்து, இரும்புச்சத்து. கரோட்டினாய்டுகள் மற்றும் நார்ச்சத்து.
4. எண்ணெய், கொழுப்பு மற்றும் கொட்டை வகைகள் • எண்ணெய் மற்றும் கொழுப்பு: வெண்ணெய், நெய், கொழுப்பு, சமையல் எண்ணெய், வேர்கடலை, கடுகு, சூரியகாந்தி எண்ணெய். • சர்க்கரை மற்றும் வெல்லம். • கொட்டை வகைகள், எள்.	சக்தி, கொழுப்பு சக்தி இன்றியமையாத கொழுப்பு அமிலம், மற்றும் உயிர்சத்துகள். சக்தி. புரதம் மற்றம் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள்.

கார்போஹைட்ரேட் அன்றாட பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு

அட்டவணை – 2

வயது	கார்போஹைரேட் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு கிராம்/ நாள்
பெரியவர்கள்	50–70
கருவுற்ற மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள்.	40–60
குழந்தைகள் (1–12 மாதங்கள்	40–50
மழலையர் (1–5 வருடங்கள்)	40–60
பள்ளி வயது குழந்தைகள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினர்.	50–70.

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகள்

கார்போஹைட்ரேட்டுகள், அவை கொண்டுள்ள சாக்கரைடுகளின் (சர்க்கரை) எண்ணிக்கையைப் பொருத்து வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. இவை எளிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள், சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் என இரு பெரும் பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எளிய கார்போஹைட்ரேட்டுகள் ஒற்றை சர்க்கரை (மோனோசாக்ரைடு) மற்றும் இரட்டைச் சர்க்கரை (டைசாக்ரைடு) ஆகும். ஸ்டார்ச், கிளைகோஜன் மற்றும் நார்ச்சத்து போன்றவை சிக்கலான கார்போஹைட்ரேட்டுகளாகும் (பாலிசாக்ரைடு).

கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகளை கீழ்க்காணும் படம் மூலம் விளக்கப்படுகிறது.

உணவு ஆதாரங்கள்

கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த முக்கிய உணவு ஆதாரங்கள், தானியங்கள், கம்பு, கிழங்கு வகைகள், பருப்பு வகைகள், சர்க்கரை மற்றும் வெல்லம்.

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 121 05-03-2020 17:25:16