Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 128

அட்டவணை – 8 கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள்

வைட்டமின்கள்	செயல்பாடுகள்	RDA	குறைப்பாட்டின் அறிகுறிகள்	நச்சுத் தன்மை
வைட்டமின் A	இயல்பான பார்வைக்கு அவசியம் (குறிப்பாக இரவு பார்வைக்கு அவசியம்) வளர்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியை ஊக்குவிக்கின்றன இனப்பெருக்கம், தோல் திசு ஆரோக்கியம் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கும் உதவுகின்றன	ஆண் 1000 ரெட்டினால் = 5000 1µ	**குறுகிய கால குறைபாடு** மாலைக் கண் தோல் கடினமாகி, வறண்டு, செதில் செதிலாக மாறும் **நீண்ட கால குறைபாடு** வழிவெண்படல வறட்சி (xerophthalmia) (வறண்டு தடித்த விழி வெண்படலம்) சிகிச்சை அளிக்கப் படாவிட்டால் குருட்டுத்தன்மை ஏற்படும்	RDA – அளவை விட 10 மடங்கு அதிகமான உட்கொண்டால் அது நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்தும். **அறிகுறிகள்** பசியின்மை உலர்ந்த மற்றும் தோல் அறிப்பு முடி உதிர்தல் கல்லீரல் சேதம், மரண அபாயங்கள் மற்றும் கருசிதைவு
வைட்டமின் D	கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ், உறுஞ்சுதலுக்கும் மற்றும் இடம்பெயர்தலுக்கும் உதவுகிறது. இரத்த்த்தில் சரியான கால்சியம் அளவை பராமரிக்க உதவுகிறது	5 – 10 µg	ரிக்கெட்ஸ் (தவறான எறும்பு உருவாக்கம்) சிறார்களிடம் காணப்படும் எலும்பு மெலிவு (Osteromalavia) பெரியவர்களிடம் காணப்படும் நோய்)	RDA அளவை விட 5 மடங்கு அதிகமாக உட்கொண்டால் அது நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்தும். **அறிகுறிகள்** பசியின்மை, இரத்த கொதிப்பு, தண்ணீர் தாகமாக இருத்தல், அதிக சிறுநீர் போக்கு இரத்தத்தில் கால்சியம் அளவு அதிகமாக இருத்தல் கால்சியம் திசுக்களில் படிதல் மரணம் சிறுநீரக செயலிழப்பு சிறுநீரக கல்.
வைட்டமின் E	எதிர் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது இது செல்லின் தோல்களை பாதுகாக்கிறது	20 – 25 mg	சவ்வுகள் அனைத்தும் சேதமடைந்து, இரத்த சிவப்பு அணுக்களை அழிக்கின்றன. (hemolyticanemia) குறைமாத குழந்தை பிறப்பு தவிர இது மனிதர்களிடம் அரிதாக காணப்படுகிறது	ஒப்பிடுகையில் நச்சுதன்மை குறைவு RDA அளவை விட 80 மடங்கு (அ) அதற்கு மேலாக உட்கொண்டால் நச்சுத்தன்மை ஏற்படும் அறிகுறிகள் தசை பலவீனம் சோர்வு குமட்டல்
வைட்டமின் K	இரத்த உறைதல் காரணிகள் உருவாக உதவுகிறது	ஆண் 70 – 80 µg பெண் 60 – 65 µg	ஒழுங்கற்ற இரத்த உறைதல், அதிக அளவு இரத்தக்கசிவு பச்சிளம் குழந்தைகளிடம் இக்குறைபாடு காணப்படும் நீண்டகால ஆண்டிபயாடிக் சிகிச்சை எடுப்பவர்களை	இயற்கையில் நச்சுத் தன்மை அற்றது அதிக அளவு உட்கொள்வதால் ஒரு வயது குழந்தைகளிடம் இரத்த சோகை மற்றும் மஞ்சள் காமாலை வர காரணமாகிறது.

05-03-2020 17:25:18