உணவு சிகிச்சை முறையின் கொள்கைகள்

1. கார்போ ஹைட்ரேட்டுகள் பொதுவாக உடலில் நன்கு சகிப்புத் தன்மை கொண்டதாக உள்ளது. மேலும் கல்லீரலில் கிளைக்கோஜன் சேர்த்து வைத்து பராமரிக்க கார்போஹைட்ரேட் தேவைப்படுகிறது.
2. கொழுப்புகளின் சகிப்புத்தன்மை ஒவ்வொரு நபர்களைப் பொறுத்து மாறுபடுகிறது. மேலும் குமட்டல் மற்றும் வாந்தி இருந்தால் கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவை எடுத்துக்கொள்ள கட்டாயப் படுத்தக்கூடாது.
3. உடல் நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் இழப்பின் காரணமாக உடலுக்கு புரதங்களின் தேவை அதிகமாகிறது. இந்நிலையில் பால், முட்டை, கோழி மற்றும் மீன் போன்ற எளிதில் செரிக்கக்கூடிய வடிவங்களில் புரதங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.
4. நோயின் போது கால்சியம் மற்றும் இரும்புச் சத்துவின் தேவையான அளவு பராமரிப்பு அவசியம் என்பதால் அதன் அளவை இரத்தப் பரிசோதனை மூலம் கண்டறிய வேண்டும்.
5. நீண்ட காலமாக கொழுப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவு உட்கொள்ளும் முறையில் இருக்கும் நோயாளிக்கு கொழுப்பில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் பெரும்பாலும் சேர்த்து கொடுக்கப்பட வேண்டும். காய்ச்சலின் போது வைட்டமின் 'c' நிறைந்த உணவு தேவைப்படும் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு காயங்கள் எளிதில் ஆற்றுவதற்கு வைட்டமின் 'c' தேவைப்படுகிறது.
6. நார்ச்சத்து மிக்க உணவு (Rouphage): ஊடுருவி அதிகபடியான நார்சத்துள்ள பொருட்கள் இருப்பின் இரைப்பை சுரப்பு நீர் ஊடுருவி செயலாற்ற முடியாது. ஆனால் குறிப்பிட்ட அளவு நார்சத்துமிக்க உணவு எடுத்துக் கொள்ளவில்லை எனில் உணவு செரிமான குறைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
7. தாவர உணவு இதன் அதிகபடியான பெருக்கம் செரிமான சாறு ஊடுருவலைத் தடுக்கிறது. ஆனால் தினசரி குடல் இயக்கத்திற்குத் தேவையான மிதமான உயர் எச்சம் போன்றவற்றை உணவுடன் சேர்க்க உதவுகிறது.
8. திரவங்கள் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியம் பொதுவாக காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற சமயத்தில் திரவங்கள் உடல் வறட்சியை தடுக்க உதவுகிறது. இந்த நிலையில் 2500 – 3000 மி.லி திரவத்தை பல்வேறு தோற்றத்தில்முடிந்தவரை பல்வேறு வகைகளில் 24 மணி நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டும்.

நீரிழிவு நோய்

கணையத்தில் உள்ள லாங்கர்ஹார்னில் (islets of Langerhans) இன்சுலின் சுரப்பு குறைவதால் (அ) இல்லாமல் போவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் நீரிழிவு நோய் எனப்படும். நீரிழிவு நோயில், இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு அதிகமாகவும் மற்றும் சிறுநீரில் குளுக்கோஸ் வெளியேறியும் காணப்படும். இதில் அதிகபடியான சிறுநீர் வெளியேற்றம், அதிகப்படியான தண்ணீர் தாகம் மற்றும் அதிகப்படியான உணவு உட்கொள்ளுதல் போன்ற அறிகுறிகள் இருக்கும்.

அட்டவணை: 12

சைவம் உண்பவர்கள்	அசைவம் உணபவர்கள்
காலை	
தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்)	தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்)
காலை உணவு	
சோள அவல் – பாலுடன் சேர்த்து பாலாடைக்கட்டி வெண்ணை கலந்த சிற்றுண்டி (வாட்டப்பட்ட ரொட்டி) தேநீர் (ம) காப்பி.	சோள அவல் – பாலுடன் சேர்த்து வேகவைத்த முட்டை வெண்ணெய் கலந்த வாட்டப்பட்ட ரொட்டி தேநீர் (அ) காப்பி.
நண்பகல்	
தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்).	தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்).
மதிய உணவு	
சமைத்த அரிசி சாதம் (அ) சப்பாத்தி (அ) ரொட்டி. சமைத்த சூப். காய்கறி சூப். அப்பளம். தயிர். வறுத்த வேர்கடலை (அ) முந்திரிப்பருப்பு. பழங்கள் (பாதி ஆப்பிள் (அ) ஒரு துண்டு பப்பாளி (அ) மாம்பழம்).	சமைத்த அரிசி சாதம் (அ) சப்பாத்தி (அ) ரொட்டி. சமைத்த பருப்பு வகைகளில் ஒன்று. ஆட்டிறைச்சி (அ) மீன் கறி. அப்பளம். தயிர். வறுத்த வேர்கடலை (அ) முந்திரிப் பருப்பு. பழங்கள் (அரை ஆப்பிள் (அ) ஒரு துண்டு பப்பாளி (அ) மாம்பழம்).
தேநீர் நேரம் உணவு (மாலை நேரம்)	
உப்பு பிஸ்கட்கள். வறுத்த கொட்டைகள். தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்).	உப்பு பிஸ்கட்டுகள் வறுத்த கொட்டைகள் தேநீர் (அ) காப்பி (சர்க்கரை இல்லாமல்).
இரவு உணவு	
பகலுணவு போன்றது.	

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 141 05-03-2020 17:25:19