குறிப்பு

உணவு சமைக்கும் போது அல்லது சமைத்த பிறகு சாதாரண உப்பு உணவில் சேர்க்க கூடாது. தினசரி உடலின் வைட்டமின் தேவை பூர்த்தி செய்ய பன்முக வைட்டமின் மாத்திரை தினமும் உட்கொள்ள வெண்டும்.

வயிற்று புண்

இரைப்பை சாறு, இரைப்பை சளிப்படலத்துடன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுவதால் இரைப்பை குடல் பாதையில் உருவாகும் நாள் பட்ட புண் வயிற்று புண் உருவாக காரணமாகிறது. இத்தகைய புண்கள் பொதுவாக முன்சிறுகுடல் மற்றும் வயிற்றில் இரைப்பை புண் ஏற்படுகின்றன. முன் சிறுகுடல் புண் அதிகபடியான அமில தன்மையுடன் தொடர்புடையது. இரைப்பை புண் அப்படி அல்ல.

வயிற்றுப்புண் உணவு முறை

வயிற்றுப் புண் சரி செய்வதில் உணவு ஒரு முக்கிய காரணியாக விளங்குகிறது. மூன்று முக்கிய உணவு வகைகள் இதில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

அட்டவணை: 19

வயிற்றுப் புண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட பெரியவர்களுக்குகான உணவு முறை (கிராம்/தலை/நாள்)

உணவு பொருட்கள்	சைவம்	அசைவம்
• அரைக்கப்பட்ட அரிசி மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கோதுமை மாவு அல்லது ரொட்டி மற்றும் பிஸ்கட்.	200	200
• பருப்பு வகைகள்(உடைத்த பருப்பு வகைகள்)	50	50
• பால்	1800	1500
• பாலாடைக்கட்டி	50	–
• முட்டைகள்	–	30
• இறைச்சி அல்லது மெல்லிய மீன் வகை	–	60
• கொழுப்பு மற்றும் எண்ணெய்கள். (2/3 அளவு அத்தியாவசிய கொழுப்பு அமிலம் அடங்கிய காய்கறி எண்ணெய்கள்)	60	60
• சர்க்கரை	60	60
• இளம் (பிஞ்சு) காய்கறிகள்	50	50
• உருளை கிழங்கு	50	50
• சதைப்பிடிப்பான பழங்கள் (வாழைப்பழம், ஆப்பிள் மற்றும் மாம்பழம்)	100	100

குறிப்பு

ஒரு வைட்டமின் 'c' (மாத்திரை 100 மி.கிராம்) தினமும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

அட்டவணை 18

உணவின் பெயர்	மூலப்பொருட்கள்
i. சிப்பியின் உணவு மற்றும் அதனின் மாற்றியமைப்பு (sippy's diet by Hurst)	அமில நீக்கி (ஆன்டசிட்) மருந்துடன் கலந்த பால், க்ரீம் (பாலேடு) மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் ஒரு முறை கொடுத்தல்.
ii. லென்ஹார்ட்ஸ் உணவு (Lenhartz diet)	பால் மற்றும் முட்டைகள் சார்ந்த திரவ உணவு.
iii. மியூலென்கிராம் உணவு (Neulengracht Diet)	இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பால், முட்டை, இறைச்சி மற்றம் மீன் (வடிகட்டிய மற்ற அரைத்த/துண்டு துண்டாக வெட்டிய) கலந்த மென்மையான உணவு.

சிப்பியின் உணவில் பால் மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய் கலந்த உணவு அதிகபடியாக உபயோகப் படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இது போதுமான அளவு கலோரியை பூர்த்தி செய்யாது. எனவே அதிக அளவு பால் அடங்கிய மென்மையான உணவு அதற்கு பதிலாக பயன்படுத்தலாம்.

அட்டவணை: 20

சைவம்	அசைவம்
காலை 6 மணிக்கு	
பால் – 2 கோப்பை (2 தேக்கரண்டி சர்க்கரைக் கலந்தது)	பால் – 2 கோப்பை (2 தேக்கரண்டி சர்க்கரைக் கலந்தது)
காலை உணவு – 8 மணி	
ரொட்டிகள் – 2 வெண்ணெய் – 2 தேக்கரண்டி பாலாடைக்கட்டி – 2 துண்டுகள் பால் – 1 கோப்பை	ரொட்டிகள் – 2 துண்டுகள் வெண்ணெய் – 2 தேக்கரண்டி அவித்த முட்டை – 1 பால் – 1 கோப்பை
காலை – 10 மணி	
பால் – 2 கோப்பை (சர்க்கரையுடன்)	பால் – 2 கோப்பை (சர்க்கரையுடன்)
நண்பகல் – 12 (மதிய உணவு)	

Unit_5_Applied_nutrition_Gen_Nur_TM.indd 144 05-03-2020 17:25:20