- முலைகாம்பின் கருப்புபகுதி நிறம் மாற்றம் அடைந்து அதன் விட்டம் அதிகரித்தல்.
- மார்பக கொழுப்பு சுரம்பிகள் (Montgomery tubercle) பெரியதாகவும்,புடைத்துக் கொண்டு தெளிவாக தெரிதல்.
- அதிக இரத்த ஓட்டத்தின் காரணமாக, மார்பகத்தின் மேற்புறத்தில் இரத்த நாளங்கள் வெளிப்படையாக தெரியும். 16–வது வாரத்திலிருந்து மார்பகத்தில் சீம்பால் சுரக்க தொடங்குகிறது. கர்ப்ப கால மாதங்கள் அதிகரிக்கும்போது சீம்பாலின் தன்மை தண்ணீர் போன்ற குறைந்த அடர்த்திலிருந்து மஞ்சள் நிறம் கலந்த அதிக அடர்த்திக்கு மாறுகிறது. சில சமயங்களில் சீம்பால் கசிவு ஏற்படலாம்.

தோல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

பிட்யூட்டரி சுரப்பியில் இருந்து அதிகமாக சுரக்கும் மெலனோசைட்டு ஹார்மோன் தூண்டுதலின் காரணமாக தோலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது.

முகம்: கன்னம் நெற்றி மற்றும் கண்ணை சுற்றிலும், அதிகப்படியான நிறமாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதை கர்ப்பகால முகமூடி என்றும் அழைக்கிறோம் (Chloasma gravidarum).

வயிறு: வயிற்றில் பழுப்பு நிறம் கலந்த கருப்பு நிறமாற்றம் கோடுகள் வயிற்றின் மேல் பகுதியிலிருந்து கீழ் வயிறு வரை தெரியும். (Xiphisternum – Symphysis pubis) பிரசவத்திற்கு பின்பு இந்த மாற்றம் தானாகவே மறைந்துவிடும். இதை லீனியா நயகரா (Linea nigra) என்று அழைக்கிறோம்.

ஸ்ட்ரியாகிராவிடம் Striae gravidarum: இந்த மாற்றம், கர்ப்பப்பை வேகமாக விரிவடைவதால் ஏற்படுகிறது. முதல் கர்ப்பத்தில் இளம்சிவப்பு நிறமாகவும் அடுத்தடுத்த கர்ப்ப காலத்தில் இளஞ்சிவப்பு வெள்ளை நிறமாகத் தெரியும்.

தாயின் எடை அதிகரிப்பு:

கர்ப்பத்தில் ஒரு குழந்தை ஒரு கருத்தரித்திருப்பின் (Single baby), கர்ப்ப காலத்தின் கடைசியில் கர்ப்பத்திற்கு முன் உள்ள எடையுடன் குறைந்த பட்சம் 11 கிலோ எடை அதிகரித்தால் ஆரோக்கியமான வளர்ச்சியாகும்.

கர்ப்ப காலத்தின் எடை அதிகரிப்பு என்பது பெண்ணின் கர்ப்பத்தின் முன்பு உள்ள உடல் நிறை குறியீட்டை பொறுத்தது. (body mass index)

மாதங்கள் / கால இடைவெளி	_	எடை அதிகரிப்பு
முதல் மூன்று மாதம்	_	1 கிலோ
இரண்டாவது மூன்று மாதம்	_	5 கிலோ
மூன்றாவது மூன்று மாதம்	_	5 கிலோ

சாதாரண பெண்ணின் எடை அதிகரிப்பு என்பது உடல் நிறை குறியீட்டை பொறுத்தது

உடல் நிறை குறியீடு (BMI)	_	எடை அதிகரிப்பு
20 லிருந்து 26 வரை (Normal)	_	11 முதல் 16 கிலோ
29.க்கு மேல் (Obese)	_	17கிலோவுக்கு குறைவாக 7 கிலோக்கு மிகக் கூடாது
19–க்கு குறைவாக (Underweight)	_	18 கிலோ வரை இருக்கலாம்

கர்ப்ப காலத்தில் தாயின் எடை அதிகரிப்பு – 6 கிலோ அதில்

உடலளவிலான மாற்றங்கள்	_	அதிகரிக்கும் எடையின் அளவு
இரத்த அளவு அதிகரிப்பதால்	_	1 – 3 கிலோ
செல்லிற்கு வெளியில் இருக்கும் நீரின் அளவு அதிகமாகுதலால்	_	2 கிலோ (ECF)
கொழுப்பு மற்றும் புரதம் சேர்வதால் அதிகமாகும் எடை	_	3 – 5 கிகி

பொதுவான எடை அதிகரிப்பு – 6 கிலோ அதில்

உடலளவிலான மாற்றங்கள்	_	எடை அதிகரிப்பு
சிசு / குழந்தை	_	3.3 கிகி
நஞ்சுக்கொடியின் அளவினால்	_	0.6 கிகி
பனிக்குட நீரினால்	_	0.8 கிகி
கர்ப்பபை விரிவடைவதால்	_	0,9 கிகி

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 159 06-03-2020 16:57:30