- சிசுவின் உடற் பாகங்கள் தட்டுப்படும்

கர்ப்பத்தை கண்டறியும் சோதனை

- இரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் பரிசோதனைகள்
- பீட்டா HCG ஹார்மோன் சோதனை (Beta HCG)
- ஸ்கேன் (USG Abdomen – Ultra sonogram)

இரண்டாவது மூன்று மாத காலம்: (13 – 28 வாரங்கள்)

- 18 – 20 வாரங்கள் உயிர்ப்பிக்கும் அளவு (Quickening) 18 – 20 தாயினால் சிசுவின் அசைவை உணர முடியும். 18 – 28 கர்ப்ப வாரத்தில்.
- சிசு வளர்ச்சியால் தொடர்ச்சியாக வயிற்றின் அடிபகுதி விரிவடைகிறது.
- முகம் மற்றும் தோல் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல் 24 வாரம் முதல்
- 18 வாரத்திற்கு பின் Braxton hick's contraction: கர்ப்பபை தசை இறுக்க 1 அல்லது 2 நிமிடம் ஏற்படுகிறது. இந்த தசை இறுக்கும் பிரசவ வலிபோல் தாயால் உணரதல்.
- கர்ப்பபை பலாட்மெண்ட் (Ballottment)
- 20வது வாரம் முதல் சிசுவின் இருதய துடிப்பை, Foetoscope கருவி மூலம் 20 வது வாரம் முதல் கேட்கலாம்
- 16 வது வாரம் முதல், டாப்லர் சிசுவின் இதய துடிப்பை கருவி மூலம் இதய துடிப்பைக் கேட்கலாம் (Doppler)

மூன்றாவது மூன்று மாத காலம் (29 முதல் 40வது வாரம்)

அறிகுறிகள்

- மாதவிடாய் தடைபடுதல் (அமினோரியா)
- வயிறு பகுதி விரிபடைதல்
- Lightening (சிசுவின் தலை, இடுப்பு எலும்பு கீழ் நோக்கி நகர்தல்)
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்

வெளிபுற மாறுதல்கள்

- தோலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அதிகமாதல்
- கர்ப்பபையின் வடிவ உருளை வடிவத்தில் இருந்து கோள வடிவமாக மாறுதல்
- பிராக்ஸ்டன் கிக் கன்ராக்ஸ்சன்
- சிசுவின் அசைவை மிக எளிதாக உணரலாம்.
- சிசுவின் உடல் பாகங்களை தொட்டு உணரதல்
- சிசுவின் இருதய துடிப்பை கேட்க முடியும்.

எதிர்ப்பார்க்கப்படும் பிரசவ தேதியை கணக்கிடுதல்

1. Naegle's Formula:
   - கடைசி மாதவிடாயின் முதல் நாள் + 7 நாட்கள் + 9 காலண்டர் மாதம்.
   - Gestational age: (கருவளர்ச்சியின் வயது)
   - முழுமையான நிறைவடைந்த வாரங்களை கணக்கிடுதல்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- கர்ப்பகாலத்தில் மெலனின் அதிகமாக சுரப்பதனால் 10–ல் 9 பெண்கள் தோலில் நிற மாற்றம் ஏற்படுவதாக உணர்கிறார்கள் ஏற்படுகிறது.
- கருவுற்ற காலத்தில் சிசுவின் உடல் முடி உருவாகும். அதை லானுகோ (Lanugo) என்றழைக்கிறோம். இந்த முடி சிசு பிறப்பதற்கு முன்பு உதிர்ந்து விடும்.
- பேரிக்காய் வடிவத்தில் இருந்த கர்ப்பப்பை, விரிவடைந்து, கர்ப்பத்தின் கடைசியில் தர்பூசணி வடிவத்தில் மாறிவிடும்.
- காலை சுகவீனம், மூன்று மாதத்திற்கு பிறகு படிப்படியாக குறைந்துவிடும். குமட்டல், வாந்தி இருக்கும் போது, சாதுவான(Bland) உணவை அதாவது வாழைப்பழம், சாதம் போன்றவைகளை சாப்பிடவேண்டும். அதிக எண்ணெய், வறுத்த உணவுகள் அதிக காரம் உள்ள உணவுகளை இரவில் தவிர்ப்பது நல்லது.

கர்ப்பகால கவனிப்பு (Antental Care)

வரையறை: கர்ப்பகால கவனிப்பு என்பது, கருத்தரித்த நாள் முதல், பிரசவம் ஆரம்பிக்கும் வரை உள்ள காலகவனிப்பு ஆகும். இதில் அடங்குபவை,

- தாயின் ஆரோக்கியத்தை பரிசோதித்தல்
- சிசுவின் ஆரோக்கியம் மற்றும் வளர்ச்சியை மதிப்பீடு செய்தல்.
- அபாயகரமான கர்ப்பத்தை நோய் திரையீடல்
- கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு சிகிச்சை செய்தல்.
- அறிவுரை வழங்குதல் மற்றும் நல கல்வியை கற்பித்தல்.

நோக்கம்

- தாய் மற்றும் சேயின் ஆரோக்கியத்தை உறுதிசெய்தல்.
- பெண்ணிற்கும், அவள் குடும்பத்தினர்க்கும் மனரீதியான ஆதரவு வழங்குதல்.

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 162 06-03-2020 16:57:31