நடை : சாதாரண / மாறுபட்ட நடை

தோரணைகள் : கைபோசிஸ் / ஸ் கே கா லி யே ா சி ஸ் / லார்டோசிஸ்

உயரம்: உயரம் குறைவாக உள்ள பெண்ணிற்கு (145 செ.மீ குறைவாக), இடுப்பு எலும்பு சிறியதாக இருப்பதால், பிரசவம் கடினமாக இருக்கும்.

எடை: கர்ப்பகாலத்தில் 11 – 12 கி.கி முறையான எடை அதிகரிப்பு

- போதுமான எடை அதிகரிப்பு இல்லாதிருந்தால், எடை குறைவுள்ள குழந்தை, வளர்ச்சி குறைவுள்ள குழந்தை மற்றும் பிறப்பு சார்ந்த விளைவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம்.
- அதிகப்படியான எடை அதிகரிப்பு, உடம்பில், நீர் தங்குதல், கர்ப்பகால இரத்தக் கொதிப்பு, இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் (Twins), பனிகுட நீர் அதிகமாக இருத்தல் (கர்ப்பகாலத்தில்) ஆகியவற்றால் ஏற்படுகின்றது.

நிறமிழப்பு: நிறமிழப்பு இருந்தால் அது இரத்த சோகைக்கான அறிகுறி.

கண்டறியப்படும் இடம்: வெண்படலம், நாக்கு, மற்றும் நகங்கள்

மஞ்சட்காமாலை: கண் விழி, மேல் தாடை மற்றும் தோலில் மஞ்சள் நிறமாற்றம் மாறுவதன் மூலம் கண்டறியலாம்.

நீர்க்கட்டு (Oedema): கால்களின் நீர்க்கட்டினை அறிய (மீடியல், மாலியோலஸ்) கணுக்கால் மற்றும் பாதங்களில் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.

மார்பகம் மற்றும் காம்புகள்: மார்பகத்தில் தோலில் மாற்றங்கள் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். சிறிய கட்டி இருக்கிறதா என்று மார்பகத்தை தொட்டு சோதனை செய்ய வேண்டும். காம்புகளில், விரிசல், அல்லது உள்நோக்கி இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும்.

பற்கள் மற்றும் ஈறுகள்: ஈறுகளில் வீக்கம், சொத்தைப்பல், வாய்வழி சுகாதாரமின்மை. இருப்பின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

சுருள் சிரை நாளங்கள்: காலில் சுருள் சிரை இருக்கிறதா என்று கவனிக்க வேண்டும் (வாரிகோஸ் வெயின்)

உயிர் ஆதார அறிகுறிகள் (Vital Signs): நாடித்துடிப்பு, சுவாசம், வெப்பநிலை, இரத்த அழுத்தம் இவற்றின் ஏதேனும் அசாதாரணம் இருந்தால் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

வயிறு பரிசோதனைகள்: ஒவ்வொரு முறை வருகையின் போது வயிறு பரிசோதனை செய்யவேண்டும்.

வயிறு பரிசோதனையின் படிகள்:

- பார்வையிடல்
- பரிசோதனை (தொட்டு பார்த்தல்)
- ஒலிச்சோதனை

பார்வையிடல்

- வயிற்றின் அளவு, கோள வடிவம், உருளை வடிவம், தொங்குகிறதுபோல், பெரிதாக அல்லது சிறியதாக.
- தோல் ஸ்ட்ராய் கிராவிடம், லினியா நையகரா
- முந்தைய அறுவை சிகிச்சையின் தழும்பு
- தோல் தொற்று நோய்க்கான ஆதாரங்கள் மற்றும் புடைத்த சிரைகள்.
- தொப்புள் – தட்டையாக மற்றும் உள்புறமாக இருத்தல்.

கர்ப்பப்பை அளவு:

12 வது வாரம் → சிம்பைசிஸ் பூபிஸ்

16 வது வாரம் → சிம்பைசிஸ் பூபிஸ்–க்கும், தொப்புளுக்கும் நடுவில்

22 வது வாரம் → தொப்புள் அளவில்

28 வது வாரம் → நெ ஞ் சு கு ழி க் கு ம் , தொப்புளுக்கும் நடுவில்

32 வது வாரம் → நெஞ்சுகுழிக்குக் கீழ்

வது வாரம் → நெஞ்சுகுழி அளவில்


40 வது வாரம் → நெஞ்சுக்குழிக்குக் கீழ் கர்ப்பப்பை இருத்தல், குழந்தையின் தலை தாயின் இடுப்பு எலும்புக்குள் நுழைந்து இருக்கிறதா என்று தொட்டு பார்த்தல் (பரிச பரிசோதனை)

தொட்டு பார்த்து பரிசோதனை செய்தல்



A. முதல் நடவடிக்கை

B. இரண்டாம் நடவடிக்கை



. மூன்றாம் நடவடிக்கை

D. நான்காம் நடவடிக்கை

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 164 06-03-2020 16:57:31