- சிம்பைசிஸ் பூபிஸ் ஃபண்டஸ் உயரத்தை அளவிடல் (SFH) (18 – 34 வாரம் – அளவிட்டு, SFH அளவீட்டை கர்ப்பகால வாரத்துடன் ஒப்பிடுதல்)

வயிறு பரிச பரிசோதனை (வயிறை தொட்டு பார்த்து பரிசோதனை செய்தல்)

- ஃபண்டஸ் உயரத்தை அளவிடல் (லியோபால்டு (Leopald's) படிகள்)
- ஃபண்டஸ் பரிச பரிசோதனை (தொட்டு பார்த்தல்) (முதல் படி)
- பக்கவாட்டின் பரிச பரிசோதனைகள் (இரண்டாம் படி)
- பெல்விக் கிரிப் – 1
- பெல்விக் கிரிப் – 2

குழந்தையின் நிலை அறிதல்

குழந்தை அமர்ந்திருக்கும் நிலை (நீளவாக்கில் உள்ள கர்ப்பப்பைக்குத் தகுந்தாற்போல்)



- கர்ப்பப்பையின் கீழ்பகுதியில் குழந்தையின் எந்த உறுப்பின் பகுதி உள்ளது என்பதை அறிதல்.
- குழந்தையின் தலை கீழே இறங்கியுள்ளதா எனப் பார்த்தல்.

ஒலிச்சோதனை

குழந்தையின் இருதய துடிப்பை டாப்ளர் ஸ்கேன் மூலம் 12 – 24 வாரத்திலும் ஃபீட்டோஸ்கோப் மூலம் 18 – 24 வாரத்திலும் கேட்கலாம்.

பரிசோதனைகள்

சிறுநீர் பரிசோதனை

- கர்ப்பத்தை சிறுநீர் சோதனை மூலம் உறுதி செய்தல்.
- சிறுநீரில் உப்பு மற்றும் சர்க்கரை கண்டறிதல்

இரத்த பரிசோதனைகள்

- இரத்த வகையை (பிரிவு) கண்டறிதல்
- இரத்த சர்க்கரையின் அளவு
- இரத்த அணுக்களின் அளவு (ஹீமோகுளோபின்)
- எச்.ஐ.வி (H.I.V.) தொற்று
- வி.டி.ஆர்.எல் (VDRL) தொற்று
- மஞ்சள் காமாலை

கர்ப்பகால அறிவுரை

ஊட்டச்சத்து

- எடை அதிகரிப்பு: சாதாரண கர்ப்ப கால எடை அதிகரிப்பு 11.5 – 16 கிலோ
- தாயின் எடை கர்ப்பகாலத்தில் குறைவாக இருப்பின், வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையின் வளர்ச்சி குறைவாகவும், குழந்தையின் எடை குறைவாகவும் இருக்கும். ஆபத்தான விளைவுகளும் ஏற்படுத்தும்.
- எடை அதிகரிப்பு அதிகமாக இருந்தால், கர்ப்பகால சர்க்கரை நோய் மற்றும் கர்ப்பகால இரத்த கொதிப்பு நோய்களின் அறிகுறியாகும்.
- புரதம் மற்றும் கலோரி: தாய்க்கு கர்ப்பகாலத்தில் ஒரு நாளைக்கு, 300 கிலோ கலோரி அளவு உணவு அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. புரதச்சத்தும் அதிகமாக தேவைப்படுகிறது. அதிகமான புரச்சத்து, குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும், நஞ்சுக்கொடி, கர்ப்பப்பை, மார்பக வளர்ச்சிக்கும், இரத்த சிவப்பணு உருவாக்கத்திற்கும், தேவைப்படுகிறது. கார்ப்பகாலத்தில் 1 கிராம் புரதம் தேவைப்படுகிறது. இது சரிபாதியாக தாய் மற்றும் சேயின் உடலில் சேர்க்கப்படுகிறது (Deposited).
- கொழுப்பு: கொழுப்பு சத்து நம் உடலுக்கு ஆற்றல் தரக்கூடிய முக்கிய ஆதாரமாகும்.
- கொழுப்பு சத்திலுள்ள பாஸ்போ லிப்ட்ஸ், பாஸ்போலிட்ஸ் நுரையீரலின் ஒட்டும் திறனை குறைக்கிறது.
- இரும்புச் சத்து: கர்ப்பகாலத்தில் தாயின் உடலில் உள்ள இரும்புச்சத்து குறைந்துவிடுகிறது. அதனால், கூடுதல் இரும்பு சத்தை, மாத்திரையாகவோ, உணவாகவோ கொடுக்க வேண்டும். கூடுதல் இரும்புசத்து தாய்க்கும் சேய்க்கும் தேவைப்படுகிறது.
- ஒரு நாள் தாயின் இரும்புச்சத்து தேவை 30 – 60 மில்லி கிராம்.
- கால்சியம்: தாயின் ஒரு நாள் கால்சிய தேவை – 1200 மில்லிகிராம்
- வைட்டமின்: ஹீம் (Heme) உருவாவதற்கு போலிக் அமிலம் தேவைப்படுகிறது. போலிக் அமிலத்தின் அளவு குறையுமாயின், இரத்த

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 165 06-03-2020 16:57:32