- நஞ்சுக்கொடி செயல்பாடு குறைந்து இருத்தல்.

நோய் கண்டறிதல்: AFI 5 – 6 செ.மீ. குறைவாக (AFI – Amniotic fluid index பனிக்குட நீரின் குறியீடு) கர்ப்பபை சிறியதாக இருத்தல்

- குழந்தையின் அசைவு குறைவாக இருத்தல்
- வயிற்றுப்பகுதியில், குழந்தையின் உடல் பாகங்கள் எளிதாக தெரிதல்
- வயிற்றில் குழந்தை இறந்துவிட்ட நிலை
- கர்ப்பபை சிறியதாக தெரிவது
- ஸ்கேன் பரிசோதனை

நோய் முன் கணிப்பு: நோயின் தீவிரத்தை பொறுத்தது

சிகிச்சை முறை

- தாய் மற்றும் சிசுவை கவனமாக கவனித்தல்
- கர்ப்பகாலத்தில் அடிக்கடி கவனித்தல், பரிசோதனை செய்தல்
- உகந்த பிரசவ தேதியை கண்டறிதல்
- நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளை பரிந்துரைத்தல்.

இடம் மாறிய கர்ப்பம் (Ectopic pregnancy)

கருத்தரித்த சினைமுட்டை கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் அதாவது கருக்குழாயில் தங்கியிருக்கும். அரிதாக சினைப்பை, கர்ப்பப்பைவாய் அல்லது வயிற்றுப்பகுதியில் தங்கியிருக்கும்.

நிகழ்வு (Incidence):

1. கர்ப்ப காலத்தில் இரத்த போக்கினால் ஏற்படும் இறப்புக்கு இது ஒரு முக்கிய தொற்று காரணமாகும்.
2. தொடர்ச்சியான கருவுறுதலை குறைக்கிறது.
3. 100ல் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணிற்கு இடம் மாறிய கர்ப்பம் ஏற்படும்

காரணங்கள்:

- பெல்லோப்பியன் டியூபில் (Fallopian tube) (கருக்குழாயில்) வடு இருத்தல்
- கருத்தரித்த ஓவம் (சினைமுட்டை) கர்ப்பப்பைக்கு வெளியில் தங்கியிருத்தல்,சாதாரணமாக பெல்லோப்பியன் டியூப், கர்ப்பப்பை, கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் வயிற்றுப்பகுதி
- தூண்டப்பட்ட பல கருச்சிதைவுகளினால்
- பெல்லோப்பியன் டியூப்பில் தொற்று கிருமிதாக்குதல்

MH8MRY

- கருக்குழாயில் அறுவை சிகிச்சை
- டை ஈத்தையல் ஸ்டில்பெஸ்ட்ரால்(DES) வெளிப்பாடு சிகிச்சை

அறிகுறிகள்:

- பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் வயிற்றுவலி, தசைப்பிடிப்பு வலி,
- கருக்குழாய் முறிவு (Tubal Rupture) : உடனடியான, நிலையான வலி பிறகு இடுப்பு மற்றும் வயிறு பகுதியில் பரவுதல்
- அதிகமான இரத்தப்போக்கு காரணமாக, தோள்பட்டை வலி மற்றும் ஆசனவாய் அழுத்தம்
- தலைசுத்தல், பலவீனம் – டியூப் முறிந்து இருந்தால், பலவீனமான நாடிதுடிப்பு, கிளாமி தோல் (மிகுந்த ஈரம்) மயக்கம், அதிர்ச்சிக்கான அறிகுறிகளை மதிப்பீடு செய்தல்

நோய் கண்டறிதல்

பீட்டா HCG ஹார்மோன் பரிசோதனை செய்தல். (500 1U / லிட்டருக்கு மேல் இருந்தால்) ஸ்கேன் பரிசோதனை செய்தல்

சிகிச்சை

- உடனடியாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கருக்குழாயை நீக்குதல் அல்லது சரிசெய்தல்
- கருக்குழாய் முறியவில்லையென்றால் – Methotrexate மீதோடிராக்சிகேட் மருந்து கொடுத்தால், கருத்தரித் முட்டையில் உள்ள செல்கள் பிரிவதற்குப் பதிலாக , செல்கள் இறந்துவிடும். பிறகு இறந்த செல்கள், இரத்தப்போக்காக வெளியேறும்

கர்ப்பகால இரத்தக் கொதிப்பு

உலக அளவில், மகப்பேறு இறப்பு, சிசு இறப்பு, சிசு உடல்நலக்குறைபாடு ஆகியவைற்றிக்கு கர்ப்பகால இரத்தக் கொதிப்பு ஒரு முக்கிய காரணமாகும், 76000 பேர் இதனால் 1 வருடத்தில் இறந்து போகின்றனர். சரியான இரத்தஅழுத்தம் உள்ள கருத்தரித்த பெண்களுக்கும் கர்ப்பகால இரத்தக் கொதிப்பானது கர்ப்பத்தின் கடைசியிலும் பிரசவத்தின் பின்பு 24 மணி நேரத்திலோ வரலாம்.

முன் சூல் வலிப்பு (Pre Eclampsia)

வரையறை

முன் சூல் வலிப்பு என்பது இரத்தக் கொதிப்பு, சிறுநீரில் புரதம் வெளியேறுதல், கால்வீக்கம் ஏற்படுதல்.

- இரத்த அழுத்தம்140/90 mmHg மேல்
- கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு இருந்த இரத்த அழுத்தத்தைவிட அதிகமாக இருத்தல்

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 169 06-03-2020 16:57:33