(சிஸ்டோலிக் (Systolic) 30 mmHg diastolic 15 mmHg)

- சிறுநீரில் புரதம் வெளிவருதல்
- முகம் வீக்கமாக இருத்தல்
- இரத்தம் அழுத்தம் அதிகமான இருத்தல். கை, மற்றும் கால்களில் நீர் சேர்ந்திருத்தல்
- கர்ப்பகாலத்தில் 20 வாரத்திற்கு பிறகு எப்போது வேண்டுமானாலும் நிகழலாம்
- சாதாரணமாக பிரசவ தேதிக்கு சற்று முன்பு இரத்தக் கொதிப்பு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மேலும் பிரசவம் ஆகும்வரை குணப்படுத்த முடியாது.

பொது அடையாளம்

- விரைவான எடை அதிகரிப்பு, முகம் மற்றும் கைகளில் வீக்கம்
- தலைவலி பார்வை மாற்றங்கள் (மங்கலான பார்வை, பார்வை இரண்டாக தெரிவது, புள்ளிகள் பார்ப்பது)
- மயக்கம், தலைச்சுற்றல், காதுகளில் ஒலி கேட்பது, குழப்பம், வலிப்பு
- மயக்கம்/ தலைச்சுற்றல், காதுகளில் ஒலி கேட்பது, குழப்பம்/ வலிப்பு

ஆபத்தான அறிகுறிகள்

- Urine– சிறுநீர் வெளிப்பாடு குறைதல்
- Sleep– தூங்குவதில் சிரமம் / தொந்தரவு
- Head ache– தலைவலி
- Epigastric– இரைப்பை மேற்பகுதி வலி மற்றும் கண் அசாதாரண அறிகுறிகள்

நிகழ்வு:

உயர் இரத்த அழுத்தத்தால் மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு தொடர் வலிப்பு அல்லது சுயநினைவை இழத்தல் தான் பேறுகால வலிப்பு எனப்படுகின்றது.

எக்லாம்ப்ளியா: [Eclampsia] பேறுகால வலிப்பு

நிகழ்வு:

- கர்ப்பத்தில் 0.2% பேர் பாதிக்கப்படுவர்
- மிகவும் தீவிர சிக்கல்கள்
- அதிகமான மகப்பேறு இறப்பு. மூளையில் இரத்தம் கசிவதினால் ஏற்படுகிறது
- மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் 8 – 36%

ஆபத்து காரணிகள்:

- 20 வயதுக்கும் கீழ் மற்றும் 40 வயதுக்கும் மேல்
- இரண்டு குழந்தை மற்றும் அதற்குமேல்
- முதல் குழந்தை
- முத்து பிள்ளை
- கருத்தரிப்பதற்கு முன்பு உயர் இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய்
- சிறுநீர் , இரத்தக்குழாய் நோய் தொடர்பான நோய்கள்
- முந்தைய கர்ப்பத்தில், கர்ப்பகால இரத்த கொதிப்பு, பிரிஎக்லாம்பிஸியா (முன்சூல் வலிப்பு) இருந்திருந்தால்

காரணங்கள்: தெரியாத காரணங்கள்

சிகிச்சை/மேலாண்மை: மேலாண்மை சிகிச்சை அறிகுறிகளைப் பொறுத்தது. பொதுவாக கர்ப்பம் முடித்தல்/ சுகப்பிரசவம் அல்லது அறுவை சிகிச்சை மூலமாக குழந்தையை அவசரமாக வெளியே எடுத்தல்.

சிகிச்சை அறிகுறிகளை பொறுத்தது

- லேசான நோய்: ஓய்வு
- வீட்டில் அல்லது மருத்துவமனையில் கண்காணித்தல்
- பிரசவ தேதி வரை காத்திருந்து பிரசவம் பார்த்தல்
- அடிக்கடி இரத்த அழுத்தம், 24 மணிநேர சிறுநீரின் அளவு, கல்லீரல் சுரப்பிகள், சிசுவின் இருதய துடிப்பு சோதித்தல்
- ஸ்கேன் பரிசோதனை

கடுமையான நோய்

- இரத்த அழுத்தம் – 160/110 mmHg அதிகரித்தல்
- இரைப்பை மேற்பகுதியில் வலி
- சிறுநீரில் புரதம் வெளிவருதல்
- கல்லீரல் சுரப்பிகள் அளவு அதிகமாக இருத்தல்
- தட்டணுக்கள் குறைவாக இருப்பது.

இலக்கு: வலிப்பு வராமல் தடுப்பது

- இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தல்
- மக்னீசியம் சல்பேட் மருந்து கொடுத்தல்

மக்னீசியம் நச்சுத்தன்மையின் அறிகுறிகள்

- இரத்த அழுத்தம் உடனடியாக குறைவது
- சுவாச தசைகள் செயலிழப்பு
- பேட்டலார் ரிப்ளக்ஸ் மறைவது (Patellar Reflex)

இவை ஏதேனும் இருந்தால், மக்னீசியம் மருந்தை நிறுத்தி விடவும்

- தேவைப்பட்டால் கால்சியம் மருந்து கொடுத்தல். ஆக்சிஜன் கொடுத்தல்.

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 170 06-03-2020 16:57:33