இறக்கம் (Descent)

கீழ் இருக்கும் குழந்தையின் பகுதி, மெதுவாகவும், படிப்படியாகவும் இறங்குதல். இது தலை மற்றும் இடுப்பெலும்பின் அமைப்பைப் பொறுத்தது.

நெகிழ்வு (Flexion)

நல்ல நெகிழ்வு, குழந்தையின் தலை இடுப்பெலும்பின் விளிம்பில் தொடுதல் மற்றும் இறங்குதலுக்கு சாதகமாக அமைகிறது.

உள் சுழற்சி (Internal rotation)

குழந்தையின் தலை, முன்னோக்கி (அல்லது பின்னோக்கி) சுழன்று, இஸ்கியல் ஃபையின் வழியாக வெளியேறுகிறது.இது இடுப்பு பகுதியில் ஏற்படுகிறது.

மணிமகுடம் (Crowning)

உட்புற சுழற்சிக்குப் பின், குழந்தை மீண்டும் இறங்குதலில் குழந்தையின் பைபெரைட்டல் விட்டமானது, பெண்ணின் கருவாய் மூலம் (வல்வா–Vulva), கர்ப்ப்பை சுருங்குதல் முடிந்தும், எந்த மந்த நிலையும் இல்லாமல் வெளிவருதல் இதனை நம்மால் காண முடியும்.

நீட்டிப்பு: (Extension)

பெரினியம் தசைகள் விரிவடைவது. குழந்தையின் உச்சிபாகம் பெரினிய தசைகளையும் விரிவடைகிறது.

- தலை பின்பகுதி, சிம்பசிஸ் பிபில் கீழ்நோக்கி வருதல்
- முகம், தாடை, முகவாய் கட்டை, பெரிணியம் தசைகளை ஊருவி வருதல்.

Restitution: குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் நிலையைப் பொறுத்து தலை வலப்பக்கமாகவோ (அ) இடப்பக்கமாகவோ திரும்பும்.

வெளிபுற சுழற்சி:

- தலை கீழ் இறங்கியது போன்ற, தோள்பட்டையும் கீழ் இறங்குதல், பின்பு, முன்புறமாகவோ பின்புறமாகவோ திரும்புதல்.
- தலை ஊசலாடுகிறது.

பக்கவாட்டு சுழற்சி:

- முன்புற தோள்பட்டை, சிம்பசஸ் பீபுஸ் வழியாக வருதல்
- முதலில் வெளிவரும் பின்புற தோள்பட்டை ஆசனவாயை தழுவியபடி இருக்கும்
- Expulsion: வெளியேற்றப்படுதல்: தோள்பட்டை வெளிவந்த பிறகு, முழு உடம்பும் உடனடியாக வெளிவருகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குழந்தை பிறந்த உடன், குழந்தையின் இரத்தத்தின் அளவு 1/3 பங்குதான் இருக்கும். 90 நொடிகள் தாமதமாக தொப்புள் கொடியை இறுக்கம் செய்தால், 60% (இரத்தம் செல்கள்) குழந்தைக்கு மேற்படியாக கிடைக்கும். இதனால், முதல் ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான இரும்புச்சத்து குழந்தைக்கு கிடைக்கும் மற்றும் வெள்ளை அணுக்கள், நோய்கிருமி உள்நுழைவதை தடுக்க உதவுகிறது. குழந்தைக்கு ஆண்டிபாடி–கள் (Antibodies) கிடைக்கும். உடலை சரிசெய்ய தேவையான தண்டு செல்கள் கிடைக்கும்.

7.7. பிரசவத்திறகு பிந்தைய காலம்

(பிரசவத்திற்கு பிந்தைய காலம் (Normal puerperium) என்பது, குழந்தை பிறந்தபின்பு உடலில் உள்ள திசுக்கள் இடுப்பு உறுப்புகள், உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் ரீதியான, கர்ப்பாகால முந்தைய நிலைக்கு மாறுவதே ஆகும்.

உடற்கூறு, மற்றும் உடலியல் மாற்றங்கள்

- கர்ப்பப்பை சுருங்குதல் (முந்தைய நிலைக்கு செல்லுதல்)
- கர்ப்பப்பையின் உள்பகுதி மறுஉற்பத்தியாகுதல். (எண்டோமெட்ரியம்).
- சிறுநீர்ப்பை, பெரியதாகுதல் மற்றும் விரிவடைதலை உணரும் தன்மை குறைந்துவிடுகிறது.
- இரத்தம் உறையும் தன்மை அதிகரித்தல்
- பிளாஸ்மா அளவு குறைந்து விடுகிறது

கர்ப்பப்பை இன்வலுசன் (Uterine Involution)

- கர்ப்பகாலத்தில், கர்ப்பப்பையின் அளவு மற்றும் எடை 11 முறை அதிகரிக்கிறது.
- விரைவான இன்வலுசன் (Ragid involution)
- குழந்தை பிறந்தவுடக் 1 கிலோவிலிருந்த 100 கிராமாக ஆக 6 வாரத்திற்குள் குறைக்கிறது.
- பாலியல் ஹார்மோன் குறைவதன் காரணமாக ஹைப்பர்ட்ரோபிக் நிறுத்தப்படுகிறது. இதன் விரைவாக, கொலாஜனேஸ் அதிகரிக்கிறது. புரோட்டியோலிடிக் என்னசம் ஊடுகதிர் புரத்ததின் தானியகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 174 06-03-2020 16:57:34