உள் பொருத்திகள் / உள் வைப்புகள் (implants)

இது ஒரு மெல்லிய நெகிழ்வான லிவோபுரோஜெஸ்ட்ரால் (Levonoregesterl) மருந்து பொருந்திய காப்ஸ்யூல்கள் (மாத்திரைகள்) ஆகும். இந்த காப்ஸ்யூல்களை பெண்ணின் முன் கைகளில் நுழைத்தல் வேண்டும். கருமுட்டை வெளிப்படுத்தலைத் தவிர்ப்பது கர்ப்பப்பை வாயின்vசளிபோன்ற வெளியேற்றத்தை தடிமனாக மாற்றுதல். குழாயின் நகர்வு மற்றும் கர்ப்பப்பையின் எண்டோமெட்டிரியத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல்.

நன்மைகள்	தீமைகள்
• மிகவும் பயனுள்ளது மேலும் பொருத்தி 24 மணி நேரத்தில் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும்.	• உள் வைப்பதற்கும் வெளியே எடுப்பதற்கும் சிறிய அறுவை சிகிச்சை அவசியம்.
• நீண்ட நாள் பாதுகாப்பு மூன்று முதல் ஐந்து வருடங்கள்.	• பாலியல் நோய்களுக்கு எதிரான எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லை.
• கருவுற்றலை தடை செய்ய உதவும்	• HBV, HIV மற்றும் STD தொற்று நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
• எண்டோமெட்டிரிய புற்றுநோய்யைத் தடுக்கும்	• இம்மாத்திரைகளை தினமும் சாப்பிட வேண்டும்
• கருக்குழாயில் கருத்தரிப்பு இரத்த சோகை ஏற்பட வாயப்பு குறைவு	

பக்கவிளைவுகள்

- மார்பகத்தில் வலி
- மென்மையான மார்பகம்
- எடை அதிகரிப்பு அல்லது குறைப்பு.
- ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்.
- மாதவிடாய் சுழற்சியின்மை.
- முகத்தில் முடிவளர்தல்
- தலைமுடிஉதிர்தல்

நிரந்தர கருத்தடை முறைகள்

கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை:

- குழந்தை வேண்டாம் என்று நினைக்கும் தம்பதிகளுக்கு இது சரியான முறையாகும்.

பெண் Female : Tubal ligation Or Tubectomy

கருக்குழாயை இறுக்கிக்கட்டுதல் அல்லது கருக்குழாயை அகற்றுதல்.


வகைகள்

- Puerperal sterilization
- Interval tubal ligatin

1. பிரசவத்திற்கு பின் செய்யும் அறுவைச் சிகிச்சை:

பிரசவத்திற்கு பின் 7 நாட்களில் செய்யும் அறுவை சிகிச்சை இரண்டு பக்கமும் கருக்குழாயின் ஒரு பகுதியை வெட்டி எடுத்தல் அல்லது இறுக்கிக் கட்டுதல்.

2. நடுவில் செய்யும் அறுவை சிகிச்சை:



இடையில் செய்யும் அறுவை சிகிச்சை அல்லது கருக்குழாய் இறுக்கிக்கட்டுதல்.

மினி லோப்ராட்டமி (Mini Lapartomy)

பொமிராய் செயல்முறையானது சுப்ராபியூரிக் பகுதியில் அந்த இடத்திற்கு உரிய மயக்க மருந்து கொடுத்து மூன்று முதல் நான்கு சென்டிமீட்டர் வரை கீறல் செய்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளுதல்.

நுண்துளை கருவி மூலம் (லேப்ராஸ்கோபிக் – Laproscopic):

நன்மைகள்	தீமைகள்
• மிகவும் பயனுள்ளது ஆனால் நீண்ட நாள் பக்க விளைவுகள் இல்லை.	• நிரந்தர செயல்முறை.
• வெளிப்புற நோயாளியாகவும் இருந்து அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம்.	• பாலியல் நோய்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு இல்லை.
	• இடம் மாறிய கர்ப்பத்திற்கு ஆபத்துஅதிகம்.

Unit_7_Midwifery_Gen_Nur_TM.indd 183 06-03-2020 16:57:35