8	முடிவு நிலை உணவு தீர்ந்த உடன் அதை நிறுத்த வேண்டும் . பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீரை கொடுக்க வேண்டும். நோயாளியின் தலையை உயர்த்த வேண்டும்.	உயர்த்துவதன் மூலம் புரை ஏறுவதை தடுக்கலாம். உணவுக்குழாயின் வழியை பாதுகாக்கலாம்.
9	வாய் பாதுக்காப்பு வாய் கொப்பளிப்பான் மூலம் வாயை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் உதடுகளை ஈரமாக வைக்க வேண்டும்.	வாய் சுத்தம் நோயாளியை திருப்திகரமாக வைக்கும்
10	உபகரணங்களை சுத்தம் செய்து திரும்ப வைக்க வேண்டும்.	நுண்ணுயிர் கிருமி பரவுவதை தடுக்கலாம்.
12	கையுறை நீக்க வேண்டும். கைகளை சுத்தம் செய்யவேண்டும்.	நுண்ணுயிர் கிருமி பரவுவதை தடுக்கலாம்.
13	தேதி, நேரம், உணவு அளவு, நோயாளியின் தன்மை ஆகியவற்றை கோப்புகளில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.	பதிவு செய்வதன் மூலம் தொடர்ச்சியான சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.

முரண் பட்ட அறிகுறிகள்

நிச்சயமான

- முகத்தில் அதிகமான காயம்
- மூக்கு தண்டுவடத்தில் அறுவை சிகிச்சை

தொடர்புடைய

- அதீதமான ரத்தக்கட்டு
- உணவுக்குழாய் வேரிஸிஸ்
- அல்கலைன் இன்ஜெக்சன்

Practical 1-8.indd 320 06-03-2020 15:46:05