மற்ற சில பாதிப்பினாலும் இந்த பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது.

- **எம்போலி ஸ்ட்ரோக்:** இரத்த கட்டு அடைப்பினால் ஏற்படும் பக்கவாதம்) மூளை அல்லாமல் பிற இடத்திலிருந்து உள்ள சிதைந்த கழிவுப்பொருட்கள் அல்லது இரத்தகட்டுகளால் இந்த பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது. மேலும், இது இதயத்தில் ஏற்பட்டு இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் குறுகிய மூளையின் தமனிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இந்த வகை இரத்த கட்டுகளால் ஏற்படும் அடைப்பை இரத்த கட்டு அடைப்பு பக்கவாதம் (Embolic Storke) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இரத்தப்போக்கு பக்கவாதம்

மூளையில் உள்ள இரத்த நாளங்களில் கசிவு அல்லது முறிவதால் இரத்தப்போக்கு பக்கவாதம் ஏற்படுகிறது. பல காரணங்களால் இரத்த நாளங்கள் பாதிக்கப்பட்டு மூளை இரத்தப்போக்கு உருவாகிறது.

இவை பின்வருமாறு:

- கட்டுப்பாடற்ற உயர் இரத்த அழுத்தம் (உயர் இரத்த அழுத்தம்)
- இரத்த உறைவுத் தடுப்பு மருந்துகள் (இரத்தத்தை மெல்லியதாக்கும் மருந்து வகைகள்)
- இரத்த நாள சுவர்களில் பலவீனமான ஏற்படுதல் (தமனி விரிசல் (அல்லது) இரத்தத்தமனி சுருங்குதல்)

இரத்தப்போக்கு பக்கவாதம் வகைகள்

- **பெருமூளை இரத்தப்போக்கு:** மூளையில் உள்ள இரத்த நாளங்களில் வெடிப்பு மற்றும் கசிவுகள் ஏற்பட்டு மூளை திசுக்களை சுற்றி இரத்தப்போக்கு உருவாகி மூளைச் செல்களை சேதப்படுத்துகிறது.
- **மூளைக்கும் மண்டை ஓட்டிற்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் இரத்தப்போக்கு:** மூளையில் உள்ள தமனியின் உள்பகுதியில் வெடிப்பு மற்றும் கசிவுகள் உருவாகி மூளைக்கும் மண்டை ஓட்டிற்கும் இடைப்பட்டப் பகுதியில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இரத்தப்போக்கு பெரும்பாலும் திடீரென கடுமையான தலைவலி மூலம் அடையாளம் காணப்படுகிறது.

நிலையற்ற இரத்த ஓட்டக் குறைவு தாக்கு

நிலையற்ற இரத்த ஓட்டக் குறைவு தாக்கு என்பது திடீரென்று பக்கவாதம் போல ஏற்படும் நிலையாகும். இதை சில நேரங்களில் சிறிய பக்கவாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அபாயக் காரணிகள்

வாழ்க்கை முறை அபாயக் காரணிகள்: அதிக எடை அல்லது பருமனான உடலமைப்பு உடல் செயலற்ற தன்மை, மது அருந்துதல், போதை மருந்துகள் மற்றும் மெத்தம்பேட்டமைன்கள் போன்ற சட்ட விரோத உணர்ச்சி இழக்க செய்யும் மருந்துகளை பயன்படுத்துவதால் அபாய நிலை உடலில் ஏற்படும்.

மருத்துவ ஆபத்துக் காரணிகள்: இரத்த அழுத்தம் 40 / 90 மில்லி மீட்டர் பாதரசம் (மிமீ உயருதல் Hg), சிகரெட் புகைத்தல் அல்லது இரண்டாம் நிலை புகைத்தல் முறை, உயர் கொழுப்பு, அதிகரித்தல் நீரிழிவு நோய், தூங்கும்போது மூச்சு திணறல் (தடுப்பு தூக்கம் மூச்சுத் திணறல்) இதய செயலிழப்பு, இதய குறைபாடுகள், இதய நோய்த் தாக்கம் அல்லது அசாதாரண இதய துடிப்பு போன்ற இதயப் பிரச்சனைகள், தனிப்பட்ட அல்லது குடும்ப வரலாறு உள்ள பக்கவாதம் பாதிப்புக்கு உள்ளான குடும்ப நபர்கள் மாரடைப்பு அல்லது நிலையற்ற இரத்த ஓட்டக் குறைவு தாக்கு உள்ளவர்கள்.

பக்கவாதத்தின் அதிக ஆபத்து தொடர்புடைய மற்ற காரணிகள் பின்வருமாறு

- வயது 55 வயதுக்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வயதிற்குட்பட்டவர்கள், இனம், பாலினம் ஆண்களைவிட பெண்கள் அதிகமான ஆபத்துக்களைக் கொண்டுள்ளனர். ஹார்மோன்கள்: ஈஸ்ட்ரோஜனை உள்ளடக்கிய பிறப்பு கட்டுப்பாடு மாத்திரைகள் அல்லது ஹார்மோன் சிகிச்சைகள், அத்துடன் கர்ப்பம் மற்றும் பிரசவத்திலிருந்தும் அதிகரித்த ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு உள்ளவர்கள்.

அடையாளங்கள் மற்றும் அறிகுறிகள்

- உடலில் ஒரு பக்கத்தில் குறிப்பாக முகம், கை அல்லது காலின் திடீர் பலவீனம், பக்கவாதம் அல்லது உணர்வின்மை ஏற்படுதல்
- ஒன்று அல்லது இரண்டு கண்களில் திடீரென தோற்றம் அல்லது பார்வை இழப்பு
- குழப்பம், பேசுவது அல்லது புரிந்து கொள்ளுவதில் சிரமம் (எ.கா. பேச்சு இழத்தல்)
- கணிக்க முடியாத திடீர் மயக்கம், நிறையற்ற தன்மை, ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் சமநிலை இழப்பு
- திடீர் கடுமையான தலைவலி

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd 59 06-03-2020 16:49:20