


நோய்கண்டறிதல்

- பேரியம் உணவு ஆய்வு
- வழக்கமான இரத்த பரிசோதனை
- ஈசோஃபேகோ கேஸ்ட்ரோ டியோடினாஸ்கோப்பி (புண்ணில் சிராய்ப்பு அல்லது இரத்தப் போக்கு ஜீரண மண்டல பகுதியில் உள்ளதா என்பதை கண்டறியும் கருவி
- ஜீரண மண்டலத்தில் உற்பத்தியாகும் அமிலங்களை பற்றி ஆய்வு
- இரத்தத்தில் ஹெச் பைலோரிக் கிருமி இருப்பதை கண்டறிதல்
- மூச்சு சுவாசத்தில் ஹெச் பைலோரிக் கிருமி உள்ளதா என்பதை கண்டறிதல்

சிகிச்சை முறை

- பொதுவான நடவடிக்கைகள்
- ஸ்டீராய்டு இல்லாத எதிர்ப்பு அழற்சி மருந்துகளின் பயன்பாடு தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
- சிகரெட் புகைப்பதை தவிர்த்தல்
- சரிவிகித சமநிலை உணவை வழக்கமான இடைவெளியில் சாப்பிடுதல்

மருந்து சிகிச்சை:

- பலதரப்பட்ட மருந்து வகைகள் (Multiple drug regimen) கொடுத்து ஹெச்பைலோரி நோய் கிருமியை சிகிச்சை செய்யலாம்.

அறுவை சிகிச்சை முறை

- பில்ரோத் I – பார்ஷியல் கேஸ்ட்ராஸ்டமி – வயிற்றில் பாதிக்கப்பட்ட குடல் பகுதியை மட்டும் அகற்றுதலாகும்.
- பில்ரோத்II–கேஸ்ட்ராஸ்டமி – புண்ணால் பாதிக்கப்பட்ட குடல் பகுதியை அகற்றிவிட்டு மீதி உள்ள குடலில் இரு பகுதியை ஒன்றோடு ஒன்றாக இணைத்து அறுவை சிகிச்சை செய்தல்.

செவிலிய மேலாண்மை

- உயிர் ஆதார அறிகுறிகளை கண்காணித்து பதிவு செய்யவும்
- நோயாளிகளுக்கு ஆரோக்கியமான சுகாதார வாழ்க்கை முறையை அறிவுறுத்துதல்

சிக்கல்கள்

- வயிற்றில் ஓட்டை, இரத்தம் கலந்த வாந்தி மற்றும் இரத்தம் கலந்த மலம் கழித்தல் போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகரித்தல்
- ஜீரண மண்டலத்தில் வெளியேற்று பகுதியில் அடைப்பு ஏற்படுதல்
- ஜீரண மண்டலத்தில் இரத்தப்போக்கு உருவாகுதல்

2.11 முன்சிறுகுடற்புண் (Duodenal Ulcer)

முன்னுரை

குடலில் ஏற்படும் புண் வகைகளில் எண்பது சதவிகிதனருக்கு முன்சிறுகுடற்புண் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. வாழ்நாட்களில் சுமார் 10% ஆண்கள் மற்றும் 5% பெண்களும் முன்சிறுகுடற்புண் நோயால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். முன்சிறுகுடற்புண் எந்த வயதினருக்கு வேண்டுமானாலும் வரலாம். ஆனால் இந்த பாதிப்பு குறிப்பாக 35 வயது முதல் 45 வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது. எந்த விதமான தொழில் செய்பவர்களாக இருந்தாலும் அல்லது அனைத்து பொருளாதார பிரிவினருக்கும் முன்சிறுகுடற்புண் ஏற்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல் பல விதமான காரணிகள் முன்சிறுகுடற்புண் உருவாக காரணமாக உள்ளது. ஹெச்.பைலோரி (H.Pylori) என்படும் பாக்டீரியா முக்கிய காரணமாக உள்ளது என்பதை கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளது. இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 90–96% வரை ஹெச்.பைலோரி (H. Pylori) என்னும் பாக்டீரியா காரணமாக உள்ளது.

வரையறை

முன் சிறுகுடல் பகுதியின் மேற்பரப்பில் புண் ஏற்படுவதை முன்சிறுகுடற்புண் என்கிறோம்.

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd 65 06-03-2020 16:49:21