காரணங்கள்

- நீரிழிவு நெப்ரோபதி
- உயர் இரத்த அழுத்தம்
- க்ளோமெருலார் அழற்சி தொற்று
- சிறுநீரக நுண்குழல் அழற்சி தொற்று (பைலோ நெப்ரைடிஸ்)
- எச்.ஐ.வி – நெப்ரோபதி
- குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் சிறுநீர் பின்னோக்கி நோய் (சிறுநீர் குழாயிலிருந்து சிறுநீரகத்தை நோக்கி செல்வது)
- பாலிசிஸ்டிக் சிறுநீரக நோய்
- சிறுநீரக தொற்றுகள் மற்றும் அடைப்புகள்
- ஈயம், காட்மியம், பாதரசம் மற்றும் குரோமியம்
- நாள்பட்ட நெப்ரைட்டிஸ்

மருத்துவ வெளிப்பாடுகள் (Clinical Manifestation)

- மாதவிடாய் சுழற்சி இன்மை
- உடல் சோர்வு மற்றும் களைப்பு
- கால்களில் நீர் கோர்வையினால் ஏற்படும் வீக்கம் (Pitting Edema)
- கண்களை சுற்றி நீர்க்கட்டு(வீக்கம்)
- விரிவடைந்த கழுத்துப் பகுதியின் நரப்புகள்
- இருதய செயலிழப்பு
- பசியற்ற தன்மை
- குமட்டல்
- வாந்தி
- வலிப்பு நோய்
- மலச்சிக்கல்
- வயிற்று புண்
- சளிப்படலப்பிதுக்கஅழற்சி(டைவர்டிகுளோசிஸ்)
- இரத்த சோகை
- நமைத்தல்
- மஞ்சள் காமாலை
- உயர் இரத்த அழுத்தம்
- இதய சுற்றுப்பை தொற்று
- புறநரம்பு கோளாறு, டயாலிசிஸ் மூலம் ஏற்படும் நினைவாற்றல் இழப்பு

நோய்க் கண்டறிதல்

- நோய் பற்றிய தகவல் சேகரித்தல்
- உடல் பரிசோதனை
- மீளக்கூடிய சிறுநீரக நோய்க் கண்டறிதல்
- சிறுநீரக அல்ராசவுண்ட் மற்றும் CT ஸ்கேன், இரத்த ஓட்டப் பரிசோதனை
- சிறுநீரகத் திசுப் பரிசோதனை
- இரத்தத்தில் – யூரியா, நைட்ரஜன், கிரியேட்டினைன், தாது உப்புகள், இரத்த சிவப்பு அணுகளின் அளவு கண்டறிதல்

மேலாண்மை

மருத்துவ முறை

- கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் பைண்டர்கள் மற்றும் பாஸ்பேட் பைண்டர்கள் அடங்கிய மருந்துகள் வழங்குதல்.
- இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த உயர் இரத்த அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்துகள்
- இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை குறைப்பதற்கும், பராமரிக்கவும் நீரழிவு நோய் கட்டுப்பாட்டு மருந்துகள் வழங்குதல்.
- திரவ உட்கொள்ளுதல் கட்டுப்பாடு – 600 மி.லி திரவத்துடன் முந்தைய நாள் சிறுநீர் வெளியீட்டையும் கணக்கிட்டு திரவம் வழங்குதல். (எ.கா. 600மி.லி + 700மி.லி =1300மி.லி)
- சிறுநீர்ப் பெருக்கிகள் – சிறுநீர் வெளியீட்டை அதிகரிக்க
- எரித்ரோபாய்டின் மருந்துகள் – இரத்த சிவப்பு அணு உற்பத்தியை பராமரிக்க
- டையாலிசிஸ் / கூழ்மப்பிரிப்பு / சிறுநீர் பிரித்தல்
  1. வயிற்று உள்ளுறை
  2. இரத்தத்தின் மூலம்

> உங்களுக்குத் தெரியுமா?
>
> பொதுவாக சிறுநீரக செயலிழப்பு 75 சதவீதம் தோல்வியடைந்தப் பிறகுதான் கண்டறியப்படுகிறது.

உணவு முறை சிகிச்சை

- குறைந்த புரதம் – 0.8கிராம் /கிலோகிராம் ஒரு நாள் சாதாரண கார்போஹைட்ரேட்டுடன் மற்றும்
- குறைந்த பொட்டாசியம் கொண்ட உணவுகள் (வாழைப்பழங்கள், உலர்பழங்கள், பழச்சாறுகள் தவிர்த்தல்).
- குறைந்த பாஸ்பரஸ் (சமைப்பதற்க்கு 24 மணி நேரத்திற்க்கு முன்பு காய்கறிகளை தண்ணீரில் ஊறவைத்தல்).

Unit_2_Medical_Surgery_Gen_Nur_TM.indd 72 06-03-2020 16:49:22