உணவுகள் அல்லது திரவங்களை உட்கொள்வதால் நோய்த் தொற்று ஏற்படுகிறது. தொற்றை ஏற்படுத்தும் இந்நோய் கிருமிகள்:

- குடல் மற்றும்/அல்லது பிற திசுக்களின் புறணி (Lining) மீது படையெடுத்து பெருகி தொற்றுநோயை ஏற்படுத்துகின்றன.
- குடலில் படையெடுத்து பெருகி நச்சை வெளிவிடுகிறது. (பாக்டீரியா மட்டும்)

உணவினால் ஏற்படும் நச்சு:

ஏற்கனவே ஒரு நச்சுத்தன்மையால் மாசுபடுத்தப்பட்ட உணவுகள் அல்லது பானங்களை உட்கொள்வதால் ஏற்படுகிறது. நச்சு மூலங்கள் பின்வருமாறு:

- சிலபாக்டீரியாக்கள்(முன்பேஉருவாக்கப்பட்ட நச்சுகள்)
- விஷத் தன்மையுடைய இரசாயனங்கள்
- விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளில் காணப்படும் இயற்கை நச்சுகள்

சால்மோனெல்லா உணவு நஞ்சாதல்

காரணிகள்: பாக்டீரியாக்களின் ஏஜென்டுகளாக கருதப்படும் சால்மோனெல்லா இனம் உணவில் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. **சால்மோனெல்லா என்டிரைடிஸ், சால்மோனெல்லா டைபிமுயூரியம்** **சால்மோனெல்லா தாம்சன்** போன்ற பாக்டீரியாக்கள் மூலம் உணவு விஷமாதல் அடிக்கடி நிகழ்கிறது. ஆனால் மற்ற வகைகள் எப்பொழுதாவது காரணமாகின்றன. சால்மோனெல்லா உணவு விஷமாதல் உணவுப் பாதையைத் தாக்கி இரைப்பை குடல் அழற்சியை (Gastroenteritis) ஏற்படுத்துகிறது. ஆனால் முழு உடலை பெரிதும் பாதிப்பதில்லை.

அறிகுறிகள்: வயிற்றுப்போக்கு, குமட்டல், வாந்தி, வயிறு உபாதை, தலைவலி, போன்றவை பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் காணப்படுகிறது. தொற்று ஏற்பட்ட உணவை உண்ட **12-26** மணி நேரத்திற்குள்ளாக அறிகுறிகள் நோயாளிகளிடம் காணப்படுகிறது.

நோயாளிகளிடம் காணப்படும் இந்த அறிகுறிகள் ஒரு சில நாட்களில் குறைந்து விடலாம் ஆனால் தன் பழைய நிலைக்கு சீராக வருவதற்கு **6-8** நாட்கள் ஆகும். இறப்பு விகிதம் குறைவாகவே காணப்படும்.

தொற்று ஏற்படத்தக்க உணவுகள்: இறைச்சி, பால் மீன் அல்லது முட்டை ஆகிய உணவுகள் மூலம் பொதுவாக இத்தொற்று பரவுகிறது. இதில் குறிப்பிட்ட விலங்கினத்திற்கு நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டிருக்கும் அல்லது வெளி

உணவு நஞ்சாதலின் அறிகுறிகள்



XII Std - Home Science TM_Unit 3.indd 96 20-04-2020 12.38.02 PM