காய்ச்சலின் போது ஏற்படும் வளர்ச்சிதை மாற்றங்கள்

1. காய்ச்சலின் போது வளர்ச்சிதை மாற்றம் அதிகரிக்கும். உடலின் வெப்பநிலை மற்றும் காய்ச்சலின் கால அளவிற்கு ஏற்றாற்போல் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரிக்கிறது. (1° C வெப்பநிலை உயரும்போது, 13 சதவிகிதம் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரிக்கிறது. 1° F வெப்பநிலை உயரும்போது, 7 சதவிகிதம் வளர்சிதை மாற்றம் அதிகரிக்கிறது).
2. கிளைக்கோஜன் சேமிப்பு குறைதல்.
3. அதிக அளவில் புரத சிதைவு ஏற்படுதல்.
4. நைட்ரஜன் கழிவு அதிகரிப்பதால், சிறுநீரகங்களின் வேலைப்பளு அதிகரித்தல்.
5. நீரின் வளர்சிதை மாற்றமும் பாதிக்கப்படுகிறது. உடல் கழிவுகள் அதிகமாக வெளியேறுவதால், உடலில் நீரின் அளவு குறைகிறது.
6. சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அதிக அளவில் வெளியேறுதல்.

1.2.1 டைபாய்டு

டைபாய்டு என்பது கடுமையான காய்ச்சலைக் குறுகிய காலத்திற்கு ஏற்படுத்தும் ஒரு தொற்று நோயாகும். ***சால்மோனெல்லா டை:பி*** என்னும் பாக்டீரியா, டைபாய்டு காய்ச்சலை உருவாக்கும். இக்காய்ச்சலின் கால அளவு குறைந்தது ***3 நாட்கள்*** அல்லது அதிகபட்சம் ***3 வாரங்கள்*** வரை நீடிக்கும்.

டைபாய்டு காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் காரணிகள்

நோய்த் தொற்றுள்ள மனிதனின் கழிவுப் பொருட்கள், மாசுபடுத்தப்பட்ட குடிநீர், பால் மற்றும் உணவு பொருட்கள் காரணமாக இந்நோய் ஏற்படுகிறது. மேலும் நோய் தொற்றுள்ள மனிதன் அல்லது ஈக்கள் மூலம் இந்நோய் பரவுகின்றது.

டைபாய்டு அறிகுறிகள்

தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடல் பகுதி வீக்கம் அடைதல், குடற் புண்கள், இரத்தக் கசிவு (haemorrhage) மற்றும் மண்ணீரல் வீக்கம் போன்றவை இந்நோயினால் உண்டாகிறது. மேலும் நோயுற்றவருக்கு,

- வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுதல் அல்லது மலச்சிக்கல் ஏற்படுதல்.
- கடுமையான வயிற்று வலி ஏற்படுதல்.
- தலைவலி மற்றும் பசியின்மை ஏற்படுதல்.

திட்ட உணவுக் கொள்கைகள்

அதிக கலோரிகள், அதிக புரதம், அதிக கார்போஹைட்ரேட், அதிக திரவம், குறைந்த கொழுப்பு, குறைந்த நார்ச்சத்து மற்றும் காரம், வாசனை இல்லாத உணவுகளை, டைபாய்டு நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படவேண்டும்.

திட்ட உணவு மேலாண்மை

- **சக்தி:** காய்ச்சலின் போது வளர்சிதை மாற்றத்தின் செயல்பாடு அதிகரிப்பதால் சக்தியின் தேவையும் அதிகரிக்கிறது. கலோரியின் தேவை 50% வரை அதிகரிக்கிறது. அதிக கார்போஹைடிரேட் திரவங்களும் மற்றும் தானிய கஞ்சிகளையும் இடையிடையே சிறிய உணவாக கொடுக்கும்போது அதிக சக்தியின் தேவையை ஈடு செய்யமுடிகிறது.
- **புரதம்:** நாள்பட்ட காய்ச்சலின் காரணமாக 100g நல்ல தரமிக்க புரதம் சேர்த்தல் அவசியமாகிறது. அதிக புரத பானங்கள் மற்றும் சூப் வகைகளை சேர்த்தல் நல்லது.
- **கார்போஹைட்ரேட்:** குளுக்கோஸை பானங்களில் இனிப்பூட்ட பயன் படுத்தலாம். மாவுச்சத்துள்ள கஞ்சி கார்போஹைட்ரேட்டை கொடுக்கிறது.
- **எலக்ரோலைட்ஸ் [அயனி திரவங்கள்]:** சோடியம் குளோரைடை சேர்த்தல் வேண்டும். சூப் கொடுப்பதன் மூலம் இதை ஈடு செய்ய முடியும். தேவையான