ii. புரத வளர்சிதை மாற்றம்

கல்லீரலில் புரத வளர்சிதை மாற்றமானது நடைபெறுகிறது. அமினோ அமிலங்கள் முக்கியமில்லா அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படுகிறது.

iii. கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றம்

லிப்போபுரதகங்கள். பாஸ்போலிப் பிடுகள் மற்றும் கொலஸ்டிராலை தயாரிக்க உதவுகிறது. **பித்தநீரையும்** உருவாக்குகிறது.

iv. தாது உப்புக்களின் வளர்சிதை மாற்றம்

அதிகபடியான உடலிலுள்ள இரும்புச்சத்து **பெரிடின்** வடிவத்தில் கல்லீரலில் சேமிக்கப்படுகிறது. மேலும் ஹீமோகுளோபின் தயாரிக்க தேவையான தாமிரமும் இங்கு சேமிக்கப்படுகிறது.

v. வைட்டமின்கள் வளர்சிதை மாற்றம்

கொழுப்பில் கரையக் கூடிய அனைத்து A,D,E மற்றும் K வைட்டமின்களும் கல்லீரலில் இருக்கும்.மேலும் கனிசமான அளவு வைட்டமின் C மற்றும் B–யும் சேமிக்கப்படுகிறது,

vi. நச்சுத் தன்மையை அகற்றுதல்

பாக்டீரியாவின் தொற்று, ஒட்டுண்ணியின் தொற்று, தாது உப்புக்களின் நச்சு அல்லது மருந்துகள் மூலம் உருவாகும் நச்சுகளை கல்லீரல் நீக்குகிறது.

vii. இதர வேலைகள்

இது இரத்தம் உறையும் காரணியை உருவாக்குகிறது.

மஞ்சள் காமாலை: பெரும்பாலான கல்லீரல் மற்றும் பித்தப்பை நோய்களுக்கு அறிகுறியாக மஞ்சள் காமாலை விளங்குகிறது. இரத்தத்தில் அதிகப்படியான பித்த நிறமிகளின் காரணமாக தோல், குடல் திசுக்கள் மஞ்சளாக நிறம் மாறுகிறது.

1.4.1 ஹெப்படைட்டிஸ்

ஹெப்படைட்டிஸ் என்பது கல்லீரலில் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் சீர்குணவு மாற்றங்கள் ஆகும்.இது பொதுவாக ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ்கள் A, B, C, D, E யினால் ஏற்படுகிறது.

ஹெப்படைட்டிஸ் நோயின் காரணிகள்

- கடுமையான தொற்றின் காரணமாக கல்லீரலில் ஏற்படும் வீக்கம்.
- பித்தநாளத்தின் வீக்கம்
- பித்தநாளத்தின் அடைப்பு
- இரத்த சோனை (Hemolytre Anaemia)

ஹெப்படைட்டிஸ் நோயின் அறிகுறிகள்

- குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
- அதிக காய்ச்சல்
- நிறமேறிய சிறுநீர் வெளியேற்றம்
- பசியின்மை
- வெளிறிய மலம்
- வயிற்று வலி (முக்கியமாக கல்லீரல் பகுதியில்), பலவீனம், சோர்வு
- எடை இழப்பு
- நீர்த்தேக்கம்

திட்ட உணவுக் கொள்கைகள்

அதிக புரதம், அதிக கார்போஹைட்ரேட் மிதமான கொழுப்பு உணவு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதிகமான உணவு உட்கொள்வதை விட சரியான இடைவெளியில் ஈர்க்ககூடிய சிறிய உணவுகளை எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

திட்டஉணவு மேலாண்மை

சக்தி: அதிக சக்தி தரும் உணவுகளை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். புரதச்சிதைவை குறைக்க அதிக கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் நோய்க்கு தகுந்தவாறு கொழுப்பும் கொடுக்கலாம். ஆரம்ப காலத்தில் திரவம், மிருதுவான காரம், வாசனை இல்லாத உணவு கொடுக்க வேண்டும்.