- **உணவுகுழாய் பாதையில் ஏற்படும் இடையூறுகள்:** குடல் இறக்கம் மற்றும் பித்தபை நோய்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு.
- **எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனைகள்**
- **புற்றுநோய்:** பெருங்குடல், மலக்குடல், ஆணின் புரோஸ்ட்ரேட், பெண்களின் கர்ப்பப்பை, மார்பகம், சினைப்பை, பித்தப்பை போன்றவைகளில் புற்றுநோய் அதிகம் ஏற்பட உடல் பருமன் காரணமாகிறது.

1.5.2 குறைந்த உடல் எடை

உலக சுகாதார அமைப்பின் படி, உடல் நிறை அலகு (BMI) 18.5க்கு கீழ் இருக்கும் நிலை 'குறைந்த எடையாக' கருதப்படுகிறது.

குறைந்த உடல் எடைக்கான காரணங்கள்

பட்டினி: பட்டினி கிடத்தல் பஞ்ச காலம் அல்லது உணவில் புரத பற்றாகுறை அல்லது உடல் எடை குறைப்பு முயற்சி மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றின்போது ஏற்படுகிறது.

தசை இழப்பு நோய்கள்: பலவீனப்படுத்தும் நோய்களான காசநோய், நீரிழிவு, உறிஞ்சுதலில் குறைபாடு உள்ள நிலை, புற்றுநோய், ஆகியவை காரணமாகிறது.

சரியான அளவு உணவு உட்கொள்ளாமை: மிக குறைந்த அளவு உணவு உட்கொள்ள செய்யும் காரணிகள்: (1)உளவியல் காரணிகளால் ஒருவர் உணவு அருந்த மறுத்தல்.(2) பசியின்மை அல்லது மூளையில் ஏற்படும் பசி, நிறைவு போன்ற தூண்டலில் பிரச்சனை, வறுமை, பற்றாக்குறை உணவு வழங்குதல்.

உறிஞ்சுதலில் உள்ள குறைபாடு: சத்துக்கள் உறிஞ்சபடாமைக்கு காரணம்: (1)நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு, (2) உணவு மண்டல பாதையின் நோய்கள், (3) அளவுக்கு அதிகமாக மலமிளக்கிகளை பயன்படுத்துதல்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Anti obesity day is celebrated on 26th November.

சுரப்பியின் சமநிலையின்மை: ஹைப்பர் தைராடிசத்தினால் உடலில் சக்தியின் தேவை அதிகரிக்கும்.

சக்தி சமநிலையின்மை: அதிக உடல் உழைப்பிற்கு ஏற்றாற் போல் உணவு எடுத்து கொள்ளாமை. சக்தி சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தும்.

ஏழ்மையான வாழ்க்கை தரம்: ஆரோக்கியமற்ற குடும்ப சூழ்நிலை அல்லது வீடு இல்லாமை காரணத்தினால் முறையற்ற மற்றும் உணவு பற்றாகுறை ஏற்படலாம்.

திட்ட உணவுக் கொள்கை

அதிக கலோரி, அதிக புரதம், அதிக கார்போஹைட்ரேட், மிதமான கொழுப்பு, நல்ல ஆதாரமுள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுஉப்புகள்.

திட்ட உணவு மேலாண்மை

சக்தி: சக்தியின் தேவை வேலைக்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது. மொத்த கலோரி உட்கொள்ளும் அளவு, சக்தி தேவையை விட அதிகமாக இருத்தல் வேண்டும்.

புரதம்: 1கி.கி. உடல் எடைக்கு 1 கிராமிற்கு பதிலாக 1.2 கிராம் புரதம் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

கொழுப்பு: கலோரியின் அளவை அதிகரிக்க கொழுப்பு நிறைந்த உணவை சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் உடம்பு ஏற்றுக் கொள்ளும் அளவு உட்கொள்ள வேண்டும்.

கார்போஹைட்ரேட்: எளிதில் ஜீரணமாக கூடியதாகவும், மேலும் அவை அதிக முதன்மை ஆற்றலை வழங்கக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும்.

வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புக்கள்: உணவின் மூலம் அதிகமாக, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுஉப்புக்கள் கிடைக்க செய்ய வேண்டும்.