அதிக அளவிலான குறைந்த அடர்த்தியுள்ள லிப்போபுரதங்கள் இருதயநோய்களை அதிகரிக்கும். மேலும், நோயின் தீவிரத்தை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லும். போதிய அளவிலான அதிக அடர்த்தியுள்ள லிப்போபுரதங்கள் இருதய நோயினின்று பாதுகாப்பு வழங்கும்.

இரத்த லிப்பிடுகளின் அளவுகள்

கொலஸ்டிராலின் அளவீடு	வகைகள்
மொத்த கொலஸ்டிரால் மிகி/dl <200 200 -239 | 240	விரும்பக் கூடிய அளவு (desirable) ஆபத்தின் விளிம்பு அளவு (Borderline high risk) அதிக ஆபத்து அளவு (high risk)
LDL கொலஸ்டிரால் (மிகி/dl) <100 100-129 130-159 160-189 | 190	உகந்த அளவு உகந்தவைக்கு அருகில் ஆபத்தின் விளிம்பு அளவு அதிக ஆபத்து அளவு மிக அதிக ஆபத்து
HDL கொலஸ்டிரால் (மிகி/dl) | 60 40-59 <40	உகந்த அளவு விரும்பக் கூடிய அளவு அதிக ஆபத்து அளவு
ட்ரைகிலிசரைடுகள் (மிகி/dl) <150 150-199 | 200	உகந்த அளவு ஆபத்தின் விளிம்பு அளவு அதிக ஆபத்து அளவு

திட்ட உணவு கொள்கைகள்

குறைந்தது முதல் மிதமான கலோரி, மிதமான கொழுப்பு (குறைந்த செறிவூட்டப் பட்ட கொழுப்பு, கொலஸ்டிரால் மற்றும் அதிக செறிவுறாத கொழுப்புகளான ஒற்றைச் செறிவுறாத கொழுப்பு மற்றும் கூட்டுச் செறிவுறாத கொழுப்பு) குறைந்த கார்போஹைட்ரேட், சாதாரண புரதம் மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

திட்ட உணவு மேலாண்மை

சக்தி

விரும்பத்தக்க உடல் எடையை பெற மொத்த சக்தி உட்கொள்ளும் அளவும் சக்தி செலவிடும் அளவும் சரியாக பொருந்துதல் வேண்டும். குறைந்த அளவு சக்தியை உட்கொள்ளுதல் மற்றும் உடல் உழைப்பை அதிகரித்தல். உடல் எடையையும் இரத்தத்தில் கொழுப்பையும் குறைக்க உதவும்.

கொழுப்பு

உணவிலிருந்து பெறப்பட்ட கொழுப்பானது இரத்தத்தின் கொழுப்பு அளவை பாதிக்கிறது. மொத்த கொழுப்பிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தியானது மொத்த கலோரியில் 25% சதவிகிதத்திற்கு மிகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும்.



- **செறிவற்ற கொழுப்பு:** செறிவற்ற கொழுப்பிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தியானது மொத்த கலோரியில் 7% சதவிகிதமாக கட்டுப்படுத்த பட வேண்டும். ஏனெனில் இக்கொழுப்பானது இரத்த கொலஸ்டிராலை அதிகரிப்பதுடன் இருதய நோய்க்கும்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

குறைந்தது வாரத்திற்கு இருமுறை 100-200 கிராம் மீன் உட்கொள்வது இருதயத்திற்கு நல்லது.

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 26 20-04-2020 3.43.49 PM