

கார்போஹைட்ரேட்

மொத்த சக்தியின் அளவில் கார்போஹைட்ரேட்டிலிருந்து கிடைக்கும் சக்தியின் அளவானது 55%-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். எளிய சர்க்கரையானது இரத்தத்தில் ட்ரைகிலிசரைடு அளவை அதிகரிப்பதால் கூட்டு சர்க்கரை வடிவத்திலான முழுதானியங்களை பயன்படுத்தலாம்.

புரதம்

சாதாரணமாக புரதம் உட்கொள்ளும் அளவு 50-60 கிராம்/நாள் – ஆக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. மாமிச புரதங்களில் அதிகமாக செறிவுற்ற கொழுப்புகளும் மற்றும் கொலஸ்டிராலும் இருப்பதால், அதனை குறைத்து மாறாக தாவர புரதங்களான பருப்புகள் மற்றும் கொட்டைகளை சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.



சோடியம்

உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கும் பட்சத்தில் சோடியம் கட்டுப்படுத்த படவேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

திராட்சையை தோலுடனும் விதையுடனும் உட்கொள்ளும்போது அதிலுள்ள ரைஸ்வரேடல் என்னும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் இருதயத்தை பாதுகாக்க உதவும்.

உணவு காரணிகள்	இருதயநோய்க்கு எதிரான பாதுகாப்பு
1. கரையும் நார்ச்சத்து (ஆப்பிள் மற்றும் மற்ற பழங்கள், ஓட்ஸ், சோயா, பார்லி, பயறுகள்)	• இரத்த கொழுப்பை குறைக்கும். • மாரடைப்பின் ஆபத்தை குறைக்கும் • LDL கொழுப்பை HDL கொழுப்பாக உயர்த்தும்.
2. பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளிலுள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்டுகளான பீட்டாகரோட்டின், லைக்கோபீன், வைட்டமின் E மற்றும் வைட்டமின் C இருக்கிறது.	• அதிரோஸ்கிளிரோஸிஸ் உருவாவதை குறைக்கிறது. • இருதய நோயாளிக்கு மாரடைப்பு வரும் ஆபத்து குறைகிறது. • LDL கொழுப்பை குறைக்கிறது.
3. சோயா (புரதம் மற்றும் ஐசோப்ளேவன்ஸ்)	• இரத்த கொலஸ்டிராலை குறைக்கும் • HDL கொலஸ்டிராலை அதிகபடுத்தும் • LDL கொழுப்பை HDL கொழுப்பாக உயர்த்தும்.
4. கொட்டைகள் (சிறிய அளவில்) அக்ரூட், பாதாம் மற்றும் வேர்கடலை	• இரத்த கொலஸ்டிராலை குறைக்கும்

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 28 20-04-2020 3.43.50 PM