மற்ற உணவு காரணிகள்

பொதுவாக சத்துள்ள சரிவிகித உணவுதிட்டமானது இருதய நோய்கான ஆபத்துகளை குறைக்கும். கூடுதலாக சிறப்பான உணவுதிட்ட உத்திகளை பின்பற்றுவது இதய நோயிலிருந்து பாதுகாக்கும்.



அடர்நிற சாக்லேட் – ஆன்டிஆக்ஸிடன் ஆற்றல் கொண்ட அடர்நிற சாக்லேட்டை (அதிக கோகோ கொண்டது) மிதமாக உட்கொள்ளும் போது LDL கொலஸ்டிரால் அளவை குறைக்கிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெரியவர்களுக்கு தேவையான நார்சத்து மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்டு கிடைக்க தினமும் 5 – 6 முறை பழங்கள் (1 முறை = 75 கிராம்) காய்கறிகள் உட்கொள்ள வேண்டும். இவற்றிலிருந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு (1/3) நார்ச்சத்து கிடைத்துவிடும் அதாவது தினசரி 30 கிராம் அளவில் 6 – 10 கிராம் கிடைக்கும்.

இதர வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்கள்

உடல்செல்பாடு: வெளிப்புற உடற் பயிற்சியான அதிவேக நடைப்பயிற்சி இருதய தசையை வலுப்படுத்துவதுடன், உடல் எடையை குறைக்கவும் அல்லது உடல் எடையை பராமரிக்கவும், அதிக அடர்த்தியான லிப்போ புரத கொலஸ்டிராலை அதிகரிக்கவும், இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை மேம்படுத்தவும் மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது.

புகைபிடித்தல் மற்றும் மன அழுத்தம்: புகைபிடித்தலை தவிர்ப்பது, மற்றும் மன அழுத்தத்தை அதற்கான வழிமுறைகளை கொண்டு கையாள்வதும் இருதய நோய் வராமல் தடுக்க உதவும்.

தனிநபர் ஆய்வு

60 வயது நிர்வாகியான குமார் என்பவர் உடற்பருமனாக உள்ளார். அவருக்கு புகைபிடிக்கும் பழக்கமும், எப்போதவது மது அருந்தும் பழக்கமும் உள்ளது. மிகவும் லட்சியவாதியான அவர் உடற்பயிற்சியில் நாட்டமின்றி உள்ளார். அவர் குடும்ப வரலாற்றில் இருதய நோயின் தாக்கம் வலுவாக உள்ளது.

1. அவருக்கான ஆபத்து காரணிகள் என்ன?
2. நீங்கள் அவருக்கு எவ்வகை வாழ்க்கைமுறை மாற்றத்துக்கான அறிவுரைகளை வழங்குவீர்கள்.

1.6.2 உயர் இரத்த அழுத்தம்

இந்தியாவில் முதல் உயிர்கொல்லும் நோயாக உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளது மேலும் இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாக நகர்புரத்து நடுத்தர வயது மக்களை பாதிக்கிறது.

தமனிச்சுவர்களுக்கு எதிரான இரத்தத்தின் அழுத்தமே இரத்த அழுத்தம் அல்லது உயர் இரத்த அழுத்தம் ஆகும். இயல்பான இரத்த அழுத்தத்தில், இருதயம் சுருங்கும்போது உள்ள அழுத்தம் சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் (SBP) எனப்படும். இது 100-140 மி.மீ. Hg வரை இருக்கும். இருதயம் விரியும்போது உள்ள அழுத்தம் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் (DBP) எனப்படும். இது 70-99 மி.மீ. Hg வரை இருக்கும்.

பெரியவர்களான 18 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டோருக்கு இருக்கும் உயர் இரத்த அழுத்தம் சிஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் எனப்படும். இது 140 மி.மீ. Hg அல்லது அதற்கு மேல் இருக்கும். மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தம் 90 மி.மீ Hg அல்லது உயர்வாக இருத்தல் ஆகும்.

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 29 20-04-2020 3.43.50 PM