உயர் இரத்த அழுத்தம் 'அமைதியாய் கொல்லும் நோய்' என்றும் அழைக்கப்படும். ஏனென்றால் இந்நோய் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறிகளையும் வெளிக்காட்டாது. இந்நோய் கண்டறியப்படாமல், சிகிச்சையளிக்காமல் அல்லது கட்டுக்குள் வைக்காமல் இருப்பின் மிக மோசமான விளைவுகளான பக்கவாதத்தில் கொண்டு சேர்க்கும்.

**உயர் இரத்த அழுத்தத்தின் வகைகளாவன:**

- **முதன்மை (அ) முக்கிய உயர் இரத்த அழுத்தம்:** இந்நிலையின் முக்கிய காரணம் அறியப்படவில்லை. இந்நிலை ஏற்பட, தவறான வாழ்க்கை முறையை தேர்ந்தெடுத்தலும் மற்றும் மரபணுவின் சிக்கலான முறையே காரணமாகிறது. வாழ்க்கை முறை காரணங்களாவன: தவறான உணவு முறை, அதிக உப்பு, குறைந்த அளவு பழங்கள் மற்றும் காய்கறி களை உட்கொள்ளுதல், உடற்பருமன், புகைபிடித்தல், உடலுமைப்பின்மை மற்றும் மன அழுத்தம் போன்றவை.
- **இரண்டாம் உயர் இரத்த அழுத்தம்:** இந் நிலையில் காரணம் அனைவரும் அறிந்ததே. இது வேறொரு நோயினால் உண்டாகும் விளைவாகும். (எ.கா.) சிறுநீரக நோயுற்றோருக்கு இரண்டாம் உயர் இரத்த அழுத்தம் இருக்கும்.

## இரத்த அழுத்தத்தின் வகைகள்

| வகை | சிஸ்டாலிக் (மி.மீ. Hg) | டையஸ்டாலிக் (மி.மீ. Hg) |
|---|---|---|
| உகந்த அளவு | <120 | மற்றும் <80 |
| இயல்பான அளவு | <130 | <85 |
| இயல்பான அளவை விட அதிகம் | 130-139 | 85-89 |
| **உயர் இரத்த அழுத்தம்** | | |
| நிலை 1 | 140-159 | 90-99 |
| நிலை 2 | 160-170 | 100-109 |
| நிலை 3 | >180 | >110 |

**ஆதாரம்:** இந்தியருக்கான வழிகாட்டுதலின் படியுள்ள உயர் இரத்த அழுத்த மேலாண்மை II, 2013.

***நிலை 1* உயர் இரத்த அழுத்தம்:** இந்நிலையில் உணவுதிட்ட மாறுதல்களில் கவனம் செலுத்தி (மருந்தில்லாமல்) உடல் உடையை குறைத்தல் மற்றும் சோடியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவை உட்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

***நிலை 2* உயர் இரத்த அழுத்தம்:** நிலை1ல் பின்பற்றபட்ட திட்ட உணவு சிகிச்சையுடன் தேவைக்கேற்ப மருந்துகளை உட்கொள்ளுதல், பொதுவாக டையூரடிக் மருந்துகள் சேர்க்கப்படும். தொடர்ந்து உட்கொள்ளப்படும் டையூரடிக் மருந்துகள் பொட்டாசியத்தையும், அதிக நீர்ச்சத்தையும் உடலிலிருந்து இழக்க செய்கிறது. தேவையான பொட்டாசியத்தை உட்கொள்ளுதல் ஒழுங்கற்ற இதயத்துடிப்பை தவிர்க்க அவசியமாகிறது.

***நிலை 3* உயர் இரத்த அழுத்தம்**: நிலை 2இல் உள்ள திட்ட உணவு மாறுதலுடன் கூடிய அதிதீவிர மருத்துவ சிகிச்சை அவசியமாகிறது. எல்லவித உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் சத்துணவின் பங்கு அவசியமாகிறது மேலும் மருந்தில்லா சிகிச்சைகளான உடற்பயிற்சி மற்றும் மன அழுத்தம் குறைக்கும் பயிற்சிகளும் உதவுகிறது.

## உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கான ஆபத்து காரணிகள்

முக்கிய ஆபத்துக் காரணிகளாவன:

- **புகைப்பிடித்தல்**: புகைப்பிடித்தல் இருதயத்தின் வேலைபளுவை அதிகரிப்பதுடன், இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகிறது. ஏனெனில் அதிலுள்ள நிக்கோடின் சிறிய இரத்த குழாய்களை சுருக்கிவிடுகிறது.
- **அதிக இரத்த கொழுப்புகள்**: அதிக இரத்த கொழுப்புகள், ஆத்ரோஸ்கிளிரோஸிஸ் மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவை வர வழிவகுக்கிறது.
- **தவறான உணவுமுறை:** உணவில் அதிக கரையாத கொழுப்பு மற்றும்



XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 30 20-04-2020 3.43.50 PM