கொலஸ்டிரால், குறைவான அளவு பழங்கள், காய்கறிகள் உட்கொள்ளுதல் போன்றவை இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும்.

- **நீரிழிவு நோய்:** பெரும்பாலும் நீரிழிவு நோய்யுள்ளவர்களுக்கு அதிக இரத்த அழுத்தம் இருக்கும்.
- **பாலினம்:** இரத்த அழுத்தத்தின் ஆபத்து பெண்களை காட்டிலும் ஆண்களுக்கே அதிகம். மற்றும் மாதவிடாய் முடிவுற்ற காலங்களில் பெண்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
- **வயது:** வயது அதிகரிக்க துவங்கியவுடன் (>60 வயது) தமனிகளின் நெகிழ்ச்சி தன்மை குறைந்து அதன் இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கும்.
- **பரம்பரை:** குடும்ப வரலாற்றில் உயர் இரத்த அழுத்தமானது பெண்களுக்கு 65 வயதுக்கு கீழும் மற்றும் ஆணுக்கு 55 வயதுக்கு கீழும் இருக்குமாயின் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இவை உயர் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
- **உடற்பருமன்:** அதிக உடல் கொழுப்பு, குறிப்பாக வயிற்றுப்பகுதி கொழுப்பானது உயர் அழுத்தம் வருவதற்கு நெருங்கிய காரணமாக விளங்குகிறது.
- **உடற்பயிற்சியின்மை:** குறைவான உடலுழைப்பு உள்ளவர்களுக்கு, உடலுழைப்பு உள்ளவர்களை காட்டிலும் இருமடங்கு உயர் இரத்த அழுத்தம் வர வாய்ப்பு உள்ளது.
- **தீவிர மன அழுத்தம்**
- **சில மருந்துகள்:** குழந்தை பிறப்பு கட்டுப்பாடு மாத்திரைகள் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும்.
- **காஃபின்:** காஃபின் உணர்திறன் அதிகமுடையவருக்கு அதிக இரத்த அழுத்தம் வர வாய்ப்பு அதிகமுள்ளது.

திட்ட உணவு கொள்கைகள்

குறைந்த கலோரி, குறைந்த கொழுப்பு, குறைந்த சோடியம் மற்றும் சாதாரண புரதம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

சக்தி

அதிக உடல் எடை மற்றும் உடல் பருமன் உள்ளவர்களின் எடையைக் குறைக்க குறைந்த கலோரி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இது குறிப்பிட்ட அளவு இரத்த அழுத்தத்தையும்



XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 31 20-04-2020 3.43.50 PM