1.7 நீரிழிவு நோய்

நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த வளர்ச்சிதை மாற்ற கோளாறுகளினால் ஏற்படும் குறைபாடே டயபட்டீஸ் மெல்லிட்டஸ் ஆகும். இன்சுலின் சுரப்பில் குறைவு ஏற்படுவதாலும், அதன் செயல்பாட்டில் குறை ஏற்படுவதாலும் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

டயபட்டிஸ் = கடந்து செல்ல; மெலிட்டஸ் = தேன் (சிறுநீரில் சர்க்கரை)

இன்சுலின் என்பது கணையத்தில் உள்ள பீட்டா செல்கள் சுர்க்கும் ஹார்மோன் ஆகும். இந்த ஹார்மோன் குளுக்கோஸை செல்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும், மேலும் அவற்றை பயன்படுத்தி உடலில் சக்தியை உருவாக்கவும் உதவுகிறது.

இன்சுலின் குளுக்கோஸை, கிகைக்கோஜனாக மாற்றி கல்லீரல் மற்றும் தசையில் சேமிக்க உதவுகிறது. மேலும் குளுக்கோஸை கொழுப்பாக மாற்றி உடலில் சேமித்து அமினோ அமிலம் அதிகளவு தசைகளால் உட்கிரகிக்கப்படுவதை ஊக்குவிக்கிறது.

நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்களுக்கு இன்சுலின் உற்பத்தி ஆவதில்லை. அல்லது சரியாக பயன்படுத்தப்படுவதில்லை. நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் போது குளுக்கோஸ் செல்களுக்குள் நுழைவதில்லை. இதனால் இரத்தத்திலேயே தங்கிவிடுகிறது. இந்நோய் அதிகரிக்கும்போது குளுக்கோஸ் சிறுநீரில் வெளிப்படுகிறது.

நீரிழிவு நோயின் வகைகள்

வகை–1 நீரிழிவு நோய் அல்லது இன்சுலின் சார்ந்த நீரிழிவு நோய்

இவ்வகை நீரிழிவு நோயால் 5 முதல் 10 சதவீதம் பேர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். கணையத்தில் உள்ள பீட்டா செல்கள் அழிவதால் இந்நோய் உண்டாகிறது.

இவ்வகை நீரிழிவு நோய் குழந்தைகள் மற்றும் குமரப்பருவத்தினரை விரைவாக தாக்குகிறது. இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் உயிர்வாழ இன்சுலினை ஊசி மூலம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

வகை–1 நீரிழிவு நோய் அல்லது இன்சுலின் சாரா நீரிழிவு நோய்

90–95 சதவீத மக்கள் வகை – 2 நீரிழிவு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உடலானது தேவையான அளவு இன்சுலின் உற்பத்தி செய்யாதபோது அல்லது இன்சுலின் செயல்பாடு இல்லாதபோது வகை – 2 நீரிழிவு நோய் ஏற்படும்.

இந்த வகை நீரிழிவு நோய் ஏற்பட மரபியியல் முக்கிய காரணமாகிறது மேலும் முதிர் வயது, உடற்பருமன் மற்றும் உடல் உழைப்பற்றவர்களிடையே இந் நோயின் தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இந்நோயானது சாதாரணமாக 40 வயதுக்குமேல் உள்ளவர்களை தான் பாதிக்கும். ஆனால் தற்போது குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினரிடமும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த வகை நோயாளிகள் உயிர்வாழ இன்சுலின் ஊசி தேவையில்லை ஆனால் உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் நீரிழிவு எதிர்ப்பு மருந்து வாய்வழியாக கொடுப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும்.



கர்ப்ப கால நீரிழிவு நோய்

இவ்வகை நீரிழிவு நோய் தற்காலிகமானது. இது நீரிழிவு நோய் இல்லாத பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. குழந்தை பிறந்த பிறகு இரத்தத்தில்

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 33 20-04-2020 3.43.51 PM