சர்க்கரையையும், கொழுப்பையையும் கட்டுப்படுத்த சிறந்ததாக இருக்கிறது. கொலஸ்டிரால் மற்றும் டிரைகிளிசரைடை குறைக்கிறது.

புரதம்

மொத்த கலோரியில் 20% புரதம் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. புரதத்துடன் கூடிய கார்போஹைட்ரேட் இரத்த சர்க்கரையின் அளவை குறைகின்றது.

கொழுப்பு

மொத்த கலோரியில் 25% த்திற்கு மிகாமல் கொழுப்பு இருக்கவேண்டும். அதிக கொழுப்பு உணவு இருதய நோய்களை உருவாக்கும் ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது. அதனால் PUFA / MUFA நிறைந்த தாவர எண்ணெயானது மாமிசம், முட்டையில் உள்ள நிறையுற்ற கொழுப்பு அமிலத்தை காட்டிலும் விரும்பதக்கது.

உப்பு

மிதமானது முதல் குறைந்த உப்பு உள்ள உணவுகள் உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நீரிழிவு நோய்க்கான மூலிகை தாவரங்கள்

ஒரு நாளுக்கு 15கி வெந்தயம் இரத்த சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கிறது. பாகற்காய் மற்றும் நாவல் பழம் குறைந்த கிளைசிமிக் தன்மை உடையது.

உணவு பரிமாற்றப்பட்டியல்

உணவினை சீரான முறையில் விநியோகம் செய்ய பழக்கமான யுக்தி உணவு பரிமாற்றப்பட்டியல் ஆகும். இதில் சம அளவு கலோரி, கார்போஹைட்ரேட், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு வழங்கும் உணவுகள் குழுவில் ஒன்றாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பரிமாற்று பட்டியல் மூலம் ஒரு தனி நபரின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப உணவுகளை உணவுக் குழுவில் மாற்றி கொள்ளலாம். (எ.கா.) தானிய பரிமாற்றுப் பட்டியல்.

இட்லி – 1½ /தோசை 1/ சப்பாத்தி1 / உப்புமா ½ கப். இது சராசரியாக 100 கி. கலோரி அளிக்கிறது.

இதே போல் காய்கறி, பழம், பருப்பு பரிமாற்றப் பட்டியலும் உள்ளது.

அ) செயற்கை இனிப்பூட்டிகள்

நீரிழிவு நோயாளிகள் சர்க்கரைக்கு மாற்றாக செயற்கை இனிப்பூட்டிகளை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் பானங்களில் அதன் பயன்படுத்தும் அளவை குறைத்து கொள்ளவது பாதுகாப்பானது.



தனி நபர் ஆய்வு

இராமன் ஒரு 45 வயதான நெருக்கடியான வேலையிலுள்ளவர் உடற்பருமனாகவும், தீவிர புகைப்பழக்கத்துடனும் மற்றும் உடலுழைப்பு இன்றியும் இருந்தார். அவருடைய இரத்த சர்க்கரை அளவானது நிலையின்றி இருந்தது. இரத்த சர்க்கரை அளவை சீர் செய்ய நீ அவருக்கு என்ன அறிவுரை வழங்குவாய்?

ஆ) உடற்பயிற்சி

வழக்கமான, மிதமான தீவிரத்துடன் கூடிய உடற்பயிற்சியான வேகமான நடைபயிற்சி இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துடன் இருதய நோய் வருவதற்கான ஆபத்தையும் குறைக்கிறது.