உணவுத்திட்ட மேலாண்மை

ஓய்வு மற்றும் எதிர்உயிரி சிகிச்சை (Antibiotic Therapy) அதனுடன் ஊட்டச்சத்து சிகிச்சையும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

நீர்க்கோர்வை, இரத்த அழுத்தம், ஆலிக்யூரியா இருந்தால் மட்டுமே சோடியம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட உணவு பரிந்துரைக்கப் படுகிறது. உட்கொள்ளும் திரவத்தின் அளவு, வெளியேற்றப்படும் திரவத்தின் அளவை பொறுத்து மாறுபடும்.

சக்தி

புரதச்சிதைவை தடுக்க மேலும் தேவையான சக்தி பெற தாராளமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் நிறைந்த உணவு உட்கொள்ள வேண்டும்.

புரதம்


நெஃப்ரான்களின் செயலிழப்பு காரணமாக, புரத சிதைவின் போது கிடைக்கும் யூரியா நைட்ரஜனை சிறுநீரகத்தால் வடிகட்ட இயலாது. ஆகையால் இரத்தத்தில் யூரியா நைட்ரஜன் [Blood Urea Nitrogen (BUN)] அதிகரித்து, சிறுநீரின் அளவு குறைந்து காணப்படும் போது புரதத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதிக புரத உட்கிரகித்தலுக்கு, அதிக உயிரியியல் மதிப்பு உடைய உணவுகளான மாமிசம், முட்டை ஆகியவை அளிக்கப்படுகிறது.

ஒரு நாளைக்கு 0.5 முதல் 1.5 கிராம்/1 கிகி உடல் எடை புரதமானது குழந்தைகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இரத்தத்தில் யூரியா நைட்ரஜன் சரியான அளவில் இருக்கும் போது 0.75 முதல் 1 கி /1 கிகி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

திரவம்

சிறுநீர் வெளியேறும் அளவை பொறுத்து திரவத்தின் அளவு கட்டுப்படுத்தபடுகிறது. திரவ கட்டுப்பாடு குறிப்பிடப்படவில்லை எனில் தேவையான அளவு திரவம் அருந்தலாம்.

குளோமருலோநெப்ரைடிஸ்



XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 41 20-04-2020 3.43.53 PM