
சிறுநீரக கற்களின் பாதிப்பு




- **மருத்துவ நிலைகள்:** இரத்த அழுத்தம், கீல்வாதம், நீரிழிவு நோய்கள்
- **மருந்துகள்:** எய்ட்ஸ், தைராய்டு ஹார்மோன்களால் ஏற்படும் நோய்கள், கீமோதெரபி மற்றும் நீண்ட நாட்களாக அமில நீக்கி (Antacid) பயன்படுத்துவது.

சிறுநீரக கற்களின் வகைகள்

அநேகமாக சிறுநீரகக் கற்கள் கால்சியம், யூரிக் அமிலம், ஸ்டுவைட், சிஸ்டின் போன்றவற்றால் உருவாகின்றன.

கால்சியம் ஆக்சலேட் கற்கள்

மிக முக்கிய தவிர்க்கக்கூடிய காரணி களான நீர்வற்றி போதல் மற்றும் குறைந்த சிறுநீர் வெளியேற்றம் மேலும் மற்ற காரணிகளான ஒரு நபரின் உணவு பழக்கத்தில் அதிக சோடியம், ஆக்சலேட் மற்றும் புரத உணவை எடுத்துக் கொள்வதும் ஆகும்.



60–80%
அனைத்து சிறுநீரக கற்கள்

கால்சியம் கற்கள்

இந்தியாவில் பொதுவாக கால்சியம் ஆக்சலேம் சிறுநீரக கற்கள் தான் காணப்படுகிறது. அது உருவாக காரணங்கள்

- குடும்ப வரலாறு
- இரத்தத்தில் அதிக அளவி கால்சியம் இருப்பது (ஹைப்பர் கால்சிமியா)
- சிறுநீரில் அதிக அளவு கால்சியம் இருப்பது (ஹைப்பர் கால்சியூரியா)
- சிறுநீரில் அதிக அளவு ஆக்சலேட் இருப்பது (ஹைப்பர் ஆக்கசலூரியா)
- சிறுநீரில் குறைந்த அளவு சிட்ரேட் இருப்பது (ஹைப்போ சிட்றட்யூரியா)
- தொற்று

யூரிக் அமில கற்கள்

- கீல்வாதம் (GOUT - சிறுநீரில் அதிக அளவு யூரிக் அமிலம் இருப்பது)
- தசை இழப்பு நோய்

ஸ்டுவைட் கற்கள்

ஸ்டுவைட் கற்கள், தொற்று கற்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், சிறுநீரக பாதையில் ஏற்படும் தொற்று தான் இக்கற்களை உண்டாக்குகின்றன. இக்கற்கள் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சத்துக்களினாலும் உண்டாவதில்லை.

XII Std - Home Science TM_Unit 1.indd 44 20-04-2020 3.43.55 PM