எனவே எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுவதில்லை. அறுவைச்சிகிச்சை மூலமே இக்கற்கள் நீக்கப்படுகின்றது.

சிஸ்டின் கற்கள்

- சிஸ்டின் கற்கள் மிகவும் அரிதானவை. இக்கற்கள் மரபுக் காரணியால் மட்டுமே வருகிறது.

மருத்துவ அறிகுறிகள்

- அதிக வலி
- பலவீனம்
- காய்ச்சல் (சில நேரங்களில்)

சிகிச்சை

திரவம்

அதிக அளவு திரவம் எடுத்துக் கொள்ளுதலே தான் அடிப்படை சிகிச்சையாகும். இது அதிக அடர்வு குறைந்த சிறுநீர் உருவாகவும் மற்றும் கற்கள் உருவாக காரணமான பொருட்கள் சேருவதையும் தடுக்க உதவுகிறது.

சிறுநீர் pH மற்றும் உணவு

- சிறுநீரின் அமில மற்றும் காரதன்மை உட்கொள்ளும் உணவை பொருத்தது.
- அதிக புரதப்பொருட்களான மாமிசம், மீன், முட்டை பருப்பு ஆகியவை சிறுநீரின் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கும். அதே சமயம் பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் பால்சிறுநீரின் காரத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.
- சிறுநீரக கற்கள் ஏற்படாமல் இருக்க அமிலத்தன்மை மற்ற காரத்தன்மை கொண்ட உணவுப் பொருட்களை சமநிலையில் உட்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
- கால்சியம் பாஸ்பேட் அல்லது ஆக்சலேடாலான கற்கள் இருக்கும்போது சிறுநீரானது காரத்தன்மை உடையதாக இருக்கும். எனவே அமில சாம்பல் உணவு சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

சேர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

தானியங்கள், மாமிசம், மீன், முட்டை, கொட்டைகள் மற்றும் பருப்புகள்

தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்

பால், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்

- யூரிக் அமில மற்றும் சிஸ்டின் கற்கள் இருக்கும்போது சிறுநீரானது அமிலத்தன்மை உடையதாக இருக்கும். எனவே கார சாம்பல் உணவு சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

சிறுநீரக கற்களின் வகைகள்



கால்சியம்



யூரிக் அமிலம்



கால்சியம் ஆக்சலேட் கற்கள்

மிக முக்கிய தவிர்க்கக்கூடிய காரணிகளா நீர்வற்றி போதல் மற்றும் குறைந்த சிறுநீர் வெளியேற்றம் மேலும் மற்ற காரணிகளான ஒரு நபரின் உணவு பழக்கத்தில் அதிக சோடியம், ஆக்சலேட் மற்றும் புரத உணவை எடுத்து கொள்வதும் ஆகும்.



ஸ்டுவைட் கற்கள்



சிஸ்டைன்

60-80%
சிறுநீரக கற்கள்

