மருந்தளித்தல்	10	12	9	15	13
உடற்பயிற்சி	6	8	3	0	2
சிறப்பு உணவு	5	9	12	8	4

தீர்வு:

படி 1 : கருதுகோள்கள்

இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$

மூன்று வெவ்வேறு நுட்பங்களினால் ஏற்பட்ட இரத்த அழுத்த சராசரி மதிப்புகளுக்கிடையே வித்தியாசம் இல்லை.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\mu_i \neq \mu_j$, (i, j); $i, j = 1, 2, 3$; $i \neq j$.

ஒரு சோடி நடத்துமுறைகளிலாவது இரத்த அழுத்த சராசரி மதிப்புகளுக்கிடையே வித்தியாசம் உள்ளது.

படி 2 : தரவு

மருந்தளித்தல்	10	12	9	15	13
உடற்பயிற்சி	6	8	3	0	2
சிறப்பு உணவு	5	9	12	8	4

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 0.05$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

$$F_0 = \frac{MST}{MSE}$$

படி 5 : கணக்கிடும் முறை

						மொத்தம்	வர்க்கம்
மருந்தளித்தல்	10	12	9	15	13	59	3481
உடற்பயிற்சி	6	8	3	0	2	19	361
சிறப்பு உணவு	5	9	12	8	4	38	1444
						G = 116	5286

வர்க்கங்கள்

மருந்தளித்தல்	100	144	81	225	169
உடற்பயிற்சி	36	64	9	0	4
சிறப்பு உணவு	25	81	144	64	16

$$\sum\sum x_{ij}^2 = 1162$$

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 94 1/28/2020 6:41:45 PM